国家级中医药继续教育项目

编号：T20163803003

便秘的诊断治疗新进展培训班

时 间：2016年5月26日至29日

地 点：浙江省立同德医院

主办单位：中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会

2016 国家级中医药继续教育项目
便秘的诊治治疗新进展培训班
讲 义 目 录

1 TST 理念与手术在便秘诊治中的运用	任东林教授
2 便秘新分类与外科治疗进展	杨向东教授
3 手助腹腔镜在结直肠外科的应用	林建江教授
4 便秘的中医治疗进展	丁义江教授
5 盆底功能障碍的诊断与治疗进展	丁曙晴教授
6 脱垂性疾病与便秘的研究与治疗进展	崔焱辉教授
7 便秘的影像学诊断进展	杨光钊教授
8 泻剂结肠的病理变化与研究进展	魏红权教授
9 慢传输型便秘的中西医结合治疗进展	陈诚豪教授
10 出口梗阻型便秘诊断新进展	蔡 珂教授

TST理念与手术在便秘诊治中的运用

任东林

什么是TST微创无痛技术？

- 称为“痔上黏膜环切术”，这是一种以肛垫病变引起痔疮这一发病机制的新认识为理论根据的新技术。TST手术是用一种称为“TST吻合器”的特殊器械，将痔上方的直肠黏膜脱垂带做环形切除。手术时先扩开肛门，于齿状线（直肠与肛管的交界线）上方约4厘米处将直肠黏膜环形缝合一圈，然后将TST吻合器插入肛门，吻合器可将脱垂的黏膜带切除下来，整个过程只需半小时左右。

什么是TST微创无痛技术？

- 由于齿状线以上的直肠黏膜受内脏神经支配，手术后患者几乎没有疼痛的感觉；又由于手术既切除了直肠黏膜脱垂带，又阻断了直肠末端动静脉的终末吻合支，消除了痔疮发生的根源，各种痔疮都有着理想的治疗效果。具有术后见效快、恢复快、无痛苦等特点。

TST技术的治疗效果怎么样？

- 痔疮的发病机制主要是“肛垫”出了问题。传统疗法多是针对痔本身，虽有一定疗效，但不十分理想，术后症状的缓解率较低；或即使取得暂时性缓解，但1、2年后症状容易复发。
- TST手术与传统疗法不同，它并不直接处理痔本身，而是用一种从美国进口的特殊器械，将痔上方的直肠黏膜脱垂带作环形切除，同时也阻断了直肠末端动静脉的终末吻合支，从而消除了痔疮发生的根源，因此效果比较理想。尤其对一些用传统疗法十分棘手的痔类型，如混合痔、环状痔、严重痔脱垂、脱肛等，TST手术也具有很好的疗效。

TST技术适合治疗哪些肛肠疾病？

- 对内痔、外痔、混合痔、环状痔、严重痔脱垂、脱肛等都有着非常理想的治疗效果。用于III、IV度内痔的治疗。

TST技术的手术原理是什么？

- 利用特制的圆形吻合器经肛门插入直肠，环形切除直肠下端肠壁的黏膜和黏膜下层组织，并在切除同时进行吻合，使脱垂的肛垫上提，恢复肛垫的正常解剖位置，起“悬吊”作用，同时切断供应痔核的动脉血液分支，起“断流”作用，从而达到根治的目地。

TST技术的优势主要有哪些？

- 1、**安全**：无需切除肛垫，最大程度保留肛门正常功能，避免肛门狭窄、肛门失禁等并发症。
- 2、**无痛**：将脱出肛门的痔疮拉回原位，同时截断向痔疮提供血液的血管，不损伤肛周皮肤，故术后几乎无疼痛。
- 3、**创伤小、恢复快**：吻合器环形切除粘膜为非开放性伤口，出血少，免除术后换药烦恼，可很快恢复正常生活。
- 4、**诊疗范围**：环形痔、多瓣痔、巨大孤立痔、内痔、外痔、混合痔、环状痔、嵌顿痔、直肠粘膜脱垂、脱肛等。
- 5、**适合对象**：因损伤少，特别适合中老年人、注重效率的白领人群及传统治疗复发者、伴有轻度脱肛与直肠粘膜内脱的患者。

哪些人不适合接受TST技术治疗？

- 对妊娠妇女、儿童、有顽固性便秘、盆腔肿瘤、门静脉高压症、布-卡综合症或不能耐受手术者均不推荐使用。

TST术后应该如何护理？

- 术后便秘或腹泻的饮食护理：该手术后一般要求患者48小时前开始排便，每日一次，大便以质软呈糊状为佳，以避免当大便排出经过创面时摩擦造成损伤和疼痛加剧。如术后3日尚无便意者，指导病人适当增加一些含植物油脂的食物，如芝麻、肉汤等，也可晚上睡前用开水冲服少量麻油或蜂蜜，经上述食疗后，一般能排出大便。若不能排出，可用开塞露小灌肠。若术后出现腹泻时，指导病人进食清淡、易消化的食物，注意饮食卫生，禁食生冷。并可饮浓茶已利小便而使大便成形，必要时可用止泻药。

TST术后应该如何护理？

- 术后当日或第二日，多因麻醉影响，手术刺激，伤口疼痛或敷料压迫，引起反射性膀胱颈部括约肌疼痛、痉挛致术后排尿困难。此类患者应饮浓茶或糖开水使尿量增多，刺激膀胱，增强尿意，也可放松压迫伤口的敷料，促使排尿。仍不能排尿者，遵医嘱给予导尿。

TST术后应该如何护理？

- 饮食结构与痔疮治愈有密切关系。若食物过细过精，会造成肠蠕动减慢，引起便秘，导致肛门直肠部位静脉曲张；若食物中辣椒或胡椒摄入过多，则会刺激肛门直肠，造成肛门直肠部位血管充血扩张；若饮食摄入过多或摄入过粗食物，易造成术后大便次数过多，引起伤口感染；若在手术前后饮食调理得当，不仅能手术顺利进行，而且对创面的修复起到重要作用，还能减轻疼痛，有利于伤口愈合，同时可防止和减少术后并发症的发生。

TST术后应该如何护理？

- (1)饮食：术后第1天流质或半流质饮食，次日可普通饮食；
- (2)排便：术后控制排便1天，并口服液体石蜡油或麻仁丸，使大便软化，便后坐浴。无需换药，肛内不必纳入栓剂等；
- (3)抗生素的使用：一般术后预防性应用抗生素1~3d，防止吻合口感染。

便秘新分类与外科治疗进展

杨向东 曹佳
成都肛肠专科医院(公立)中国PPH技术培训中心

成都肛肠专科医院院长
榜样中国●四川十大名医
成都中医药大学博士生导师
四川大学硕士研究生导师
四川省中医药学会副秘书长
四川省老年医学会副秘书长
成都市中医药学会副会长
中国名族医药学会肛肠分会执行会长
四川省医师协会肛肠分会会长
成都市中医药学会肛肠专委会主任委员
中国PPH技术培训中心主任
中国PPH技术资格认证委员会主任委员
中国便秘联谊会会长
中国医药高等教育学会肛肠学会副会长
中华中医药学会肛肠分会副会长
世界中医药联合会肛肠学会副会长
中国肛肠网[www.chgw.com]总编辑
中国农工党全国中医药文化与肛肠专科建设特邀主任

医护圈里疯传的从医宝典《一》：需要警惕的14种患者

1. 看过3名以上专家

2. 满嘴都是专业术语

3. 和医生探讨手术怎么做

4. 一见医生就泪流满面，说你是救命稻草，甚至下跪

5. 到处是疼痛点

6. 行为古怪

7. 总皱眉头，面相不善，尖锐

8. 一上来就问，我这病是不是被XXX误诊了

9. 治疗后效果不好者

10. 一见面就请吃饭喝酒者

11. 动不动就拍照、录音、录像者

12. 反正我们不懂，你们看着办吧

13. 多家属没有统一意见

14. 有钱任性、有权支招的人太多刻薄

1. 看过3名以上专家

2. 满嘴都是专业术语

3. 和医生探讨手术怎么做

4. 一见医生就泪流满面，说你是救命稻草，甚至下跪

5. 到处是疼痛点

6. 行为古怪

7. 总皱眉头，面相不善，尖锐

8. 一上来就问，我这病是不是被XXX误诊了

9. 治疗后效果不好者

10. 一见面就请吃饭喝酒者

11. 动不动就拍照、录音、录像者

12. 反正我们不懂，你们看着办吧

13. 多家属没有统一意见

14. 有钱任性、有权支招的人太多刻薄

医护圈里疯传的从医宝典《一》：需要警惕的14种患者

- 1. 看过3名以上专家
- 2. 满嘴都是专业术语
- 3. 和医生探讨手术怎么做
- 4. 一见医生就泪流满面，说你是救命稻草，甚至下跪
- 5. 到处是疼痛点
- 6. 行为古怪
- 7. 总皱眉头，面相不善，尖锐
- 8. 一上来就问，我这病是不是被XXX误诊了
- 9. 治疗后效果不好者
- 10. 一见面就请吃饭喝酒者
- 11. 动不动就拍照、录音、录像者
- 12. 反正我们不懂，你们看着办吧
- 13. 多家属没有统一意见
- 14. 有钱任性、有权支招的人太多刻薄

我们的经历。。。。。

关于便秘的传说.....

一、奇怪的便秘现象

21岁某，术前状态

开腹所见

术中所见

一条巨蟒被成功“降服”

例 4

受便秘困扰20多年，需每天早起即乘坐公交车直至晚上才能排便，造成莫大心理压力。

• 经过手术、中医药等综合治疗后，现已成功摆脱便秘困扰。

五、“健步如飞”的帕金森

例 10

陶某，男，58岁

诊断：1、慢性顽固性便秘（重度B期 混合型）
2、帕金森病

入院胃肠心理评估：器质性心境障碍，中度抑郁病史；帕金森病10年，近2月无法排便，药物、灌肠均无效。腹胀、肛门坠胀不适，无法正常进食及入睡。有多次自杀倾向，家属带其辗转数十家医院就诊，没有一个医生愿意为其手术。

扶入医院

术前钡灌肠

两年时间跑了60家医院的军人雷某

八、以院为家的老革命

王爷爷，87岁
重度结肠瘫痪
症患者，已在
我院住院3、4
年，行保守治
疗，每年花费
几十万。

九、“小肚鸡肠”的肠弯弯

结肠冗长

肠壁菲薄

十、迷茫的杨大爷

杨大爷

- 1.所有检查都没有问题
- 2.为什么大便排不出来
- 3.我该怎么办
- 背景：杨大爷86岁，患高血压、糖尿病、耳聋、腿脚残疾；生活不能自理。

十一、惊悚的排气声

恐怖的便秘

例 11

姓名：李某某
 性别：女
 年龄：70岁
 主诉：排便困难14年，全身气动气窜，必须排出才能缓解。

我们的体会

十个便秘九个疯，还有一个想腾空！

我们的理论

结肠瘫痪症学说

我们的意见

1. 轻度便秘不能手术
2. 重度便秘必须慎重手术
3. 中度便秘才是最佳手术时机

我们的观点

外科手术应该是慢性顽固性便秘的终极治手段
——只有实践与完善，毋庸置疑

我们的经验

重度便秘慎重手术，不是不能手术，但是必须
要条件具备，才能手术：

1. 熟练的外科手术技能
2. 强大的中医临床技能
3. 专业的精神心理辅助

长期的临床实
践证实，外科手
术是STC有效的
治疗方法。

临床外科杂志2009年4月
第17卷第4期，232-233

无限风光在险峰

谢谢

成都肛肠专科医院/中国PPH技术培训中心

手助腹腔镜在结直肠外科的应用

浙江大学医学院附属第一医院肛肠外科
浙江省结直肠疾病诊治中心
林建江

手助腹腔镜在结直肠外科的应用

- 1 技术概述
- 2 手术操作
- 3 病例总结
- 4 应用体会

概述

手助腹腔镜手术(Hand-Assisted Laparoscopic Surgery ,HALS)是近年来兴起的一种新型腹腔镜手术方式,是指术者经特定的手助器将非优势手伸入腹腔从而协助完成手术。

概述

- 1 安全、微创
- 2 减少手术时间
- 3 降低平均住院日
- 4 缩短腹腔镜学习曲线

概述

手术操作

手术操作

患者体位、手术切口选择以及术者位置

	体位	手助切口	腔镜光源	超声刀	术者
右半结肠	截石位	绕脐切口	左侧平脐 15cm	左下腹 反麦氏点	患者腿间
左半结肠	截石位	绕脐切口	剑突下 4-5cm	左侧平脐 15cm	患者腿间
乙状结肠	截石位	绕脐切口	耻骨上2cm	右侧平脐 15cm	患者右侧
直肠	截石位	绕脐切口	耻骨上2cm	右侧平脐 15cm	患者右侧
全结肠	右半—左半—乙状—直肠				

Company Logo

手术操作

右半结肠切除术

Company Logo

手术操作

左半结肠切除术

Company Logo

手术操作

乙状结肠、直肠切除术

Company Logo

手术操作

Company Logo

手术操作

手术图片

Company Logo

病例总结

- ❖ 本中心从2000年初开展HALS，主要限于良性疾病患者，随后逐渐开展结直肠癌的手术，近4年来，更是得到了迅速发展，共计开展90余例（数据统计至2013.4），成为了全国HALS四大中心之一。
- ❖ 开展的术式包括：右半、左半、乙状结肠、低位Dixon、Hartmann、Miles、次/全结肠切除术、全结肠切除+回肠储袋+肛管吻合+回肠保护性造口、联合脏器切除等。

Company Logo

病例总结

本中心2009.8-2013.4统计资料

恶性肿瘤 (644)

	例数
右半	127
左半	24
横结肠	12
乙状结肠	79
Dixon	368
Hartmann	9
Miles	17

良性疾病 (48)

	例数
STC	21
FAP	10
UC	1
类缘病	4
其他	12

Company Logo

病例总结

本中心2009.8-2013.4统计资料

恶性肿瘤

手术时间	(135±40) min
出血量	(118±56) ml
肠道恢复	(65.4±8.3) d
住院时间	(9.1±3.5) d
淋巴清扫	(13.9±5.1)
中转率	11例(1.7%)
并发症	23例 (3.6%)

良性疾病

手术时间	(240±65) min
出血量	(155±45) ml
肠道恢复	(68±12.3) d
住院时间	(8.9±3.8) d
中转率	0%
并发症	2例 (4.2%)

Company Logo

病例总结

- ❖ 以上手术中，联合其他脏器切除的共有0例，包括胆囊、肝脏等；
- ❖ 中转原因：共11例（均为恶性病变）；肿瘤侵犯周围脏器、术中暴露困难、出血等；
- ❖ 并发症共25例（恶性病变23例，良性2例），包括：周围脏器损伤、肠梗阻、吻合口漏、吻合口出血、腹腔出血等；其中9例经再次手术治疗后缓解，另16例经保守治疗后缓解；

Company Logo

病例总结

本科特色：
手助腹腔镜Dixon+回肠自闭性保护性插管造口术

主要适用于低位或超低位的Dixon，或者吻合不满意的患者；回肠自闭性保护性插管造口是我科的一项特色，创造性的使用气管插管行自闭性回肠插管造口术，到目前为止，取得了非常满意的效果。（常规开腹手术中120余例+手助腹腔镜中30余例）

Company Logo

病例总结

本科特色：
手助腹腔镜Dixon+回肠自闭性保护性插管造口术

➔

Company Logo

病例总结

本科特色：
手助腹腔镜Dixon+回肠自闭性保护性插管造口

→

Company Logo

病例总结

本科特色：
手助腹腔镜Dixon+回肠自闭性保护性插管造口术

自闭性造口的优势：(1) 操作简单，粪便转流确切；(2) 术后2-3周左右可以拔除插管，造瘘口能自行愈合；(3) 相比常规的回肠祥式造口，此法造口护理简单，造口相关并发症少；(4) 同时避免了二次回纳手术及相应的风险，极大的减轻了患者的痛苦和经济负担

Company Logo

病例总结

本科特色：
手助腹腔镜Dixon+回肠自闭性保护性插管造口术

手助腹腔镜+自闭性插管造口技术的联合应用，在低位直肠肿瘤的微创治疗中起到极大的作用；同时我们也将此法应用于接受术前新辅助放化疗的直肠肿瘤患者，创伤小，疗效确切，增加保肛率，避免二次手术，并发症少等等；

相关文章投稿中.....

Company Logo

本中心所发表的相关文献

- ❖ Hand-assisted laparoscopic VS open right hemicolectomy: short-term outcomes in a single institution from China. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2012 22(3):267-71
- ❖ 本文比较了常规开腹手术和手助腹腔镜手术在右半结肠肿瘤根治术中的应用情况(HALS=59, OS=57);
- ❖ 研究表明: HALS组的术中出血更少、术后疼痛更轻、手术切口更短、术后恢复更快、住院时间更短; 手术时间略长; 而在淋巴结清扫、术后并发症等方面无统计学差异;
- ❖ 结论: HALS在右半结肠肿瘤根治术中是安全可行的。

Company Logo

本中心所发表的相关文献

- ❖ Hand-assisted laparoscopic surgery versus the open approach in curative resection of rectal cancer. *J Int Med Res* 2010; 8: 916-922
- ❖ 本文比较了常规开腹手术和手助腹腔镜手术在直肠肿瘤根治术(Dixon)中的应用情况(HALS=98, OS=88);
- ❖ 研究表明: HALS组的术中出血更少、手术切口更短、术后恢复更快、住院时间更短; 而在手术时间、淋巴结清扫、术后并发症等方面无统计学差异; 在随访期内未发现肿瘤局部复发。
- ❖ 结论: HALS在直肠肿瘤根治术中是安全可行的。

Company Logo

本中心所发表的相关文献

- ❖ 手助腹腔镜技术在结肠良性病变中的应用 *中华普通外科杂志*, 2011, 26(10): 879-880
- ❖ 本文回顾性分析本中心2009.8-2010.4实施的18例手助腹腔镜次全结-直肠切除术患者的临床资料; 其中结肠无力症11例, FAP 6例, 溃疡性结肠炎1例。
- ❖ 研究表明: 18例手术均顺利完成, 无中转开腹, 术后无严重并发症发生; 全部患者均随访至今, 随访时间1-19个月; 生活质量良好;
- ❖ 结论: 手助腹腔镜次全结-直肠切除术治疗结肠良性病变是一种安全、微创的手术方式。

Company Logo

本中心所发表的相关文献

- ❖ Hand-assisted laparoscopic VS open right hemicolectomy: short-term outcomes in a single institution from China *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech*, 2012;
- ❖ Hand-assisted laparoscopic surgery versus the open approach in curative resection of rectal cancer. *J Int Med Res*, 2010;
- ❖ 手辅助腹腔镜下直肠癌根治术 *中华外科杂志* 2012;
- ❖ 手辅助腹腔镜结直肠癌肝转移一期同步切除术六例分析 *中华普通外科杂志* 2012;
- ❖ 111例手辅助腹腔镜结直肠癌根治术短期疗效分析 *中华胃肠外科杂志* 2011;
- ❖ 手辅助腹腔镜技术在结肠良性病变中的应用 *中华普通外科杂志* 2011;
- ❖ 腹腔镜技术在结肠慢传输型便秘手术中的应用 *腹部外科* 2011;
- ❖ 手辅助腹腔镜全结肠切除型回肠储袋肛管吻合术治疗家族性腺瘤性息肉病 *中华外科杂志* 2011;
- ❖

Company Logo

应用体会

- ❖ HALS作为一种新兴的手术方式，它既具备腹腔镜手术微创的优点，又保留了传统开腹手术直观的特点，已被越来越多的外科医师所接受。
- ❖ 在结直肠外科，许多中心的研究表明，HALS的手术效果要优于传统的开腹手术或者全腹腔镜手术。

Company Logo

应用体会

HALS
优势

- 1 视、触结合，心手相应
- 2 操作安全，根治彻底
- 3 微创手术，恢复良好
- 4 易于掌握，学习曲线短
- 5 特有的手助器——“蓝碟”

Company Logo

应用体会

A 切口选择

- ❖ 属于“万能切口”，基本上可以满足不同部位肿瘤的需求；
- ❖ 切口位于中间，腹腔内操作空间大，探查全面；
- ❖ 绕脐切口，借助其生理凹陷，切口愈合较美观；
- ❖ 若需中转开腹，便于切口延长；

Company Logo

应用体会

B 中转开腹率

- ❖ 各中心报道不一，国内文献报道约为9%-0.9%；而国外文献报道约为0%-15%；
- ❖ 中转原因包括：结直肠癌远处转移、肿瘤周围浸润、肿瘤周围器官侵犯、肿瘤巨大等等。
- ❖ 本中心，中转开腹率为1.7% (11/644)；我们认为这与术前评估的完善程度和腹腔镜操作技巧的熟练程度有关。

Company Logo

应用体会

C 术后并发症

- ❖ 研究表明，HALS的术后并发症要低于开腹手术，尤其是切口相关并发症；而国外有研究发现HALS和全腹腔镜手术的并发症相仿；
- ❖ 本中心，术后并发症发生率为8.6%(25/692)；其中的尿漏与胆漏病例，我们认为可能是术中分离过程中，超声刀热力灼伤所致；

Company Logo

应用体会

D 淋巴结清扫

- ❖ 就腹腔镜手术而言，对于深部组织的良好照射、放大效应及准确操作，可确保病灶的彻底切除和淋巴结的清扫；有文献报道，HALS 结直肠手术可较全腹腔镜手术获得更多的淋巴结数目；
- ❖ 本中心，HALS 肿瘤根治术中的淋巴结清扫个数为 (13.9±5.1) 个；

Company Logo

应用体会

E 使用技巧及注意事项

- ❖ 合理安排手助器和Trocar的位置,两者距离应大于10厘米；
- ❖ 放置手助器的切口长度适合，长度一般为术者四个手指的宽度；
- ❖ 充分利用手助切口，必要时可以通过手助切口进行直视下手术操作；

Company Logo

应用体会

E 使用技巧及注意事项

- ❖ 术者非优势手进入腹腔时，可带一干纱布，便于术中及时擦拭血迹，以保持视野清晰；
- ❖ 注意周围器官的保护，防止超声刀的热灼伤；
- ❖ 注意术者与扶镜助手的良好配合；
- ❖ 熟练掌握超声刀或能量平台的使用，既保证手术安全，又能缩短手术时间；

Company Logo

应用体会

F 不足之处

- ❖ 从经济角度看，手术费用相对较高是该技术较难被广大患者接受的原因之一；
- ❖ 相比开腹手术而言HALS对术者的手术技巧有更高的要求；
- ❖ 另外，在腹腔内手的操作易导致组织渗血，而且辅助手在腹腔内操作有增加术后肠粘连之虞；

Company Logo

应用体会

F 不足之处

- ❖ HALS手术时，特别要求术者和扶镜助手的默契配合；
- ❖ HALS也存在一定的并发症发生率，尤其是超声刀的热损伤；
- ❖ 长时间手术操作，辅助手易疲劳；
- ❖ 此外，Trocar穿刺孔肿瘤种植转移也是腹腔镜外科技术发展中需要关注的问题之一；

Company Logo

展 望

总体而言，HALS在结直肠外科以及其他腹腔脏器手术方面已经显示出优越性，但其应用规范、相关原则以及适应症的选择等等仍需进一步明确，我们相信随着腹腔镜器械发展，操作技能的提高和更多经验的积累，HALS将会有着更广阔的应用前景。

Company Logo

科室简介

❖ 前身是痔科，创建于50年代初。60年代初陆琦主任曾经先后两次为敬爱的周恩来总理治疗痔疮而闻名海内。1984年发展为肛肠外科，科室目前有医护人员80名，医师30名，其中教授、主任医师5名，副主任医师6名，主治医师12名，博士生8名，硕士生12名。现有4个病区，核定病床120余张，实际收治病人约50张。电子结肠镜检查室及肛门直肠测压室各一个。**每年开展结直肠癌手术1200余例，良性结直肠周疾病手术1300余台。**

Thank You ! ...

肛门疾病 Fissure 肛裂

肛裂切除术后并发症

Complication	Operation	
	F	
Persistence of pain	-	
Persistence of bleeding	-	
Urinary retention	1 (3.3%)	
Incontinence to flatus or fecal soiling	2 (6.2%)	
Infection (abscess or fistula)	-	
Fissure recurrence	1 (3.1%)	
Anal stenosis	-	
Total complications	4 (12.5%)

Mousavi SR, et al. J Gastrointest Surg, 2009,13:1279-1282.

肛门疾病 Fistula 肛瘻

- 肛瘻切开术
 - 直接切开
 - 切割挂线
- 挂线引流
- 全括约肌保留手术
 - 瘻管剔除术
 - 直肠推移瓣手术
 - 生物蛋白胶充填
 - 肛瘻栓治疗
 - 间置手术

失禁
复发

肛门疾病 Fistula 肛瘻

肛瘻术后失禁

Reference, Author (yr)	n	Follow-Up (mo)	Continence Disorders	Assessment Method
(9) van Tels (1994)	312	12	27.0% minor disorders	Questionnaire
(3) Garcia-Aguilar (1998)	363	29	42.0% fistulotomy 63.0% seton and fistulotomy	Questionnaire
(26) Mylonakis (2001)	74	3	21.0%	CIS score
(46) Cavanaugh (2002)	110	< 24-> 60	64.0%	FISI score
(17) Westberg (2003)	60	24	50.0% (92.0% High fistulas)	Questionnaire
(18) Rosa (2006)	844	24	6.0%	Questionnaire
(19) van der Hagen (2006)	103	75	6.0%	ND
(20) Toyonaga (2007)	148	12	20.3%	CCF-FI score
(22) Ortz (2008)	206	42	9.0%	CCF-FI score
(23) van Koperen (2008)	109	36	41.3%	Valzey/COREFO

Pastor C, et al. Fistulotomy. Semin Colon Rectal Surg, 2009;20:18-23.

肛门疾病 Fistula 肛瘻

系统性回顾经括约肌肛瘻术后失禁的发生

Author	Year	Number	Surgical procedure	Follow-up	Continence disorder
Aguilar et al. [94]	1985	151	Muc. adv. flap	8 months-7 years	19%
Alcarian et al. [95]	1987	70	Muc. adv. flap	1-7.5 years	8%
Wobell et al. [96]	1987	29	Muc. adv. flap	18 months-4 years	28% postoperative disorder unchanged; others complete continence
Kodner et al. [97]	1993	107	Rect. adv. flap	7 months	20% improvement
Athanasidis et al. [98]	1994	189	Muc. adv. flap	1-7.5 years	18% achievement
Miller and Finan [99]	1998	26	Rect. adv. flap	14 months	21%
Zimmermann et al. [37]	2001	26	Abdominal flap	25 months	52% postoperative disorder
Willis et al. [100]	2000	37	Muc. adv. flap	29 months	0
Ortiz and Mirra [101]	2000	103	Rect. adv. flap	12 months	8%
Gustafson and Graf [41]	2002	42	Rect. adv. flap	12 months	42%
Van der Hagen et al. [102]	2005	30	Rect. adv. flap	22 (8-52) months	31% slight impairment
Perez et al. [103]	2005	35	Sphincter division with reconstruction	32 months	31% preoperative incontinence
Urbe et al. [104]	2007	56	Rect. adv. flap	44 months	12.5% minor incontinence
					9% major incontinence

Ommer A, et al. Int J Colorectal Dis, 2008;23:1023-1031.

肛门疾病 Fistula 肛瘻

切割挂线术后失禁的发生

Author	year	Number of patients	Continence Disorder
Deodhar et al.	1975	937	0
Cobb	1984	20	0%
Christensen et al.	1986	41	0-30%
Hart et al.	1988	3	0
Phin and Kagar	1988	19	15-20%
Mira and Kagar	1988	93	0
Smith et al.	1989	9	0
Sharma et al.	1991	155	5-20%
Williams et al.	1993	13	51-50%
Talry	1993	3	0-50%
Graf et al.	1995	92	51-50%
MCCormick and Frisley	1996	16	18-30%
De la Torre and Saraco	1997	16	0-50%
Mishra et al.	1997	114	0
Wadhvani et al.	1997	23	0
Cobb and Elliott	1998	92	37-50%
Hidvegyi et al.	2000	28	0-50%
Hsu et al.	2001	40	0-50%
Ishter and Al Saraya	2001	47	36-20%
Encarnacion Torres et al.	2002	42	0
Purgian et al.	2002	10	50%
Carroll et al.	2002	4	50%
Therapopoulos et al.	2002	41	0
Zhou et al.	2003	24	8-20%
Hartel et al.	2004	12	0
Mendes et al.	2004	50	50%
Gonzalez-Ruiz et al.	2006	31	0

Ritchie RD, et al. Colorectal Dis. 2009;11(6):564-71.

平均失禁发生率：
11.2%

肛门疾病 Fistula 肛瘻

Complication after treatment of primary and recurrent fistulas

Type of complication	Primary fistulas, 242 patients (80.7%)	Recurrent fistulas, 58 patients (19.3%)
Recurrent fistula	13 (5.4)	30 (51.7)
Gas and/or stool incontinence	9 (3.7)	22 (39.7)

Complication after treatment of single-and multi-tract fistulas

Type of fistula	Number of patients (%)	Number of recurrences (%)	Number of cases of incontinence (%)
Single-tract	266 (88.7)	32 (12)	22 (8.3)
Multi-tract	34 (11.3)	11 (32.4)	10 (29.4)

Sygot A. Late results of treatment of anal fistulas. Colorectal Dis. 2007;9(2):161-8.

炎性肠病 Inflammatory Bowel Disease

- 溃疡性结肠炎(UC)
- 克罗恩病(CD)

- 肛门狭窄与失禁
- 腹痛
- 腹泻
- 粘液脓血便
- 全身并发症

炎性肠病 Inflammatory Bowel Disease

Fatigue and Health-Related Quality of Life in Pediatric Inflammatory Bowel Disease
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2009;7:554-561

self-report statistically different mean total fatigue and subscale scores compared with children with rheumatologic diseases or cancer. **Conclusions:** In children with primarily inactive IBD, fatigue was significantly higher and HRQOL was significantly lower than in healthy controls. Results among children with IBD were comparable to children with rheumatologic diseases and cancer.

IBD患儿与健康相关的生活质量明显低于正常者

Perianal Crohn's disease most commonly presents with perianal abscesses and fistulas, and significantly jeopardizes patients' quality of life

CD肛周病变严重影响患者生活质量

结直肠肿瘤 Colorectal Tumor

所有外科医师的共识，奋斗的目标

↓

手术必须达到根治、彻底

↓

扩大手术范围

↓

创伤 并发症 后遗症

严重影响器官功能、生活质量

结直肠肿瘤 Colorectal Tumor

- 术式的改善
- 器械的完善
- 分子靶向治疗
- 多学科合作

保肛术式（肛门功能）
新辅助化疗的实施
腹腔镜技术

目标：提高生存率的同时必须改善生活质量

结直肠肿瘤 Colorectal Tumor

• 不同手术方式带来的排便障碍（便秘和腹泻）

Type of Procedure with Prevalence of Patient-Reported Constipation and Diarrhea			
Operation	No. of Patients	% with Constipation	% with Diarrhea
Without stoma			
Right hemicolectomy	58	27.6	39.6
Left hemicolectomy	26	38.5	19.2
Anterior resection (without stoma)	30	22.2	14.8
Subtotal colectomy with ileorectal join	5	20.0	100
All nonstoma patients	119	28.3	31.4
With stoma			
Anterior resection with loop stoma	51	2.1	41.7
APR or Hartman's with end colostomy	30	30.0	17.2
All stoma patients	81	12.4	32.6
All patients	200*	21.9	31.9

APR = abdominoperineal excision
 *One patient with an end ileostomy resulting from a leak after right hemicolectomy excluded.

Wilson TR et al. Measurement of Health-Related Quality of Life in the Early Follow-Up of Colon and Rectal Cancer. Dis Colon Rectum, 2006;49:1692-1702

结直肠肿瘤 Colorectal Tumor

Long-Term Results of Intersphincteric Resection for Low Rectal Cancer

TABLE 3. Defecatory function evaluated at 12 to 24 months after ISR in 104 patients who underwent stoma closure

	Total ISR (n = 19)	Subtotal ISR (n = 16)	Partial ISR (n = 69)
Bowel frequency (per week) ^a	4.5 (2.4)	3.8 (1.3)	3.5 (1.5)
Wexner's score ^b			
Continent patients (Kiewit Grade 1, 2)	48 (5.6)	3.2 (4.1)	3.7 (5.8)
Incontinent patients (Kiewit Grade 3, 4)	13.3 (5.6)	13.4 (12.1)	12.4 (3.7)
Evacuation disorder (n)			
Constipation	3 (15.8%)	2 (12.5%)	11 (15.9%)
Dyschezia	3 (15.8%)	3 (18.8%)	9 (13.0%)
Used enemas	1 (5.3%)	0	2 (2.9%)

低位直肠癌保肛术后患者大便次数增多，失禁评分升高，伴有不同程度排便障碍

Dis Colon Rectum 2009; 52: 1065-1071

结直肠癌 Colorectal Tumor

Analysis of Clinical Factors Associated with Anal Function after Intersphincteric Resection for Very Low Rectal Cancer

Masaaki Ito, M.D., Norio Saito, M.D., Masanori Saito, M.D., Akihiro Kobayashi, M.D., Yumiko Nishizawa, M.D., Yoshiyuki Tsunoda, M.D.

In conclusion, **preoperative CRT was found to be the factor most strongly associated with poor anal function after ISR**, suggesting that patients with rectal cancer who undergo ISR after preoperative CRT are very likely to experience incontinence. This information should be given to patients when they are offered a choice of treatment. Since postoperative anal function after ISR

术前放疗会严重影响直肠癌ISR术后肛门功能

Dis Colon Rectum 2009; 52: 64-70

结直肠癌 Colorectal Tumor

Quality of Life in Patients With Colorectal Cancer 1 Year Postoperative Compared With the General Population: A Population-Based Study

Timothy R. Wilson, B.Sc., M.B.Ch.B., David J. Alexander, M.B.B.S., M.S., P. Kund, M.Phil.

采用**癌症患者生活质量测定量表 (EORTC QLQ-C30)**, 结直肠癌患者情感和社会功能明显低下, 尤其青年患者

Diseases of the Colon & Rectum
Measurement of Health-Related Quality of Life in the Early Follow-Up of Colon and Rectal Cancer

青年、造口、伴有腹泻或便秘的结直肠癌术后患者生活质量更差

结直肠癌 Colorectal Tumor

多学科协作诊治模式下新辅助化疗联合手术治疗结直肠癌患者的生存质量评估

张俊杰, 刘春娟, 陈增喜, 邢 娟, 李 杰

比新辅助化疗后更严重, 其生存质量更低 (P=0.001)。结论: MDT 诊治模式下新辅助化疗联合手术治疗过程中, 化疗干预手段会使生存质量降低, 这可能与其副作用有关, 但其不良反应并不会实际影响到术后患者的部分主观感受; 附加手术干预手段可能加重患者术后近期内更多的不适感的主要原因, 但并不额外增加综合治疗后患者的生存质量负担。不同综合治疗模式对患者生存质量的影响, 以及综合治疗的成本效果是需要进一步探讨的问题。

Chin J Bases Clin General Surg, Vol. 15, No. 5, May 2008

功能性结直肠肛门疾病

罗马 III

2006 成人 6类

A. 功能性食管病 (4)

- A1. 功能性烧心
- A2. 功能性食管源性胸痛
- A3. 功能性吞咽困难
- A4. 噬球症

B. 功能性胃十二指肠病 (8)

- B1. 功能性消化不良-餐后不适、上腹痛
- B2. 功能性腹胀-吞气症 非特异性
- B3. 功能性恶心和呕吐症-特发性、功能性、周期性
- B4. 成人反刍综合征

C. 功能性肠病 (5)

- C1. 肠易激综合征
- C2. 功能性腹胀
- C3. 功能性便秘
- C4. 功能性腹泻
- C5. 非特异性功能性肠病

E. 直肠和SO功能障碍 (3)

- E1. 直肠功能障碍
- E2. 直肠SO功能障碍
- E3. 直肠SO功能障碍

F. 功能性肛门直肠病 (7)

- F1. 功能性大便失禁
- F2. 功能性肛门直肠疼痛
- F3. 功能性排便障碍

D. 功能性腹痛综合征 (1)

慢性便秘中出口梗阻型便秘 577例

- 盆底失弛缓型 325
- 盆底松弛型 153
- 混合型 82
- 合并肛门直肠痛 17
- 有效率 73.7%

慢性便秘 Chronic Constipation

Table 1.1. Prevalence of constipation by gender

Study	Population source	Year	Constipation definition	Overall prevalence (%)	Males (%)	Females (%)
Sandler ¹⁴	NHANES I	1971-75	Self-report	12.8	7.0	18.2
Evehart ¹⁵	NHANES I	1971-75	Self-report	15.8	8.0	20.8
Johanson ⁷	NHIS	1983-87	Self-report	1.9	0.9	2.8
Hagan ¹⁶	NHIS	1989	Self-report	3.4	1.3	4.9
Talley ¹⁷	Olmsted county	1991	Strain and hard Or <3/wk	17.4	13.9	20.8
Talley ¹⁷	Olmsted county	1993	Self-report	5.0	2.7	7.3
			Rome I FC	19.2	18.3	20.1
			Rome I DD	11.0	5.2	16.5
			Rome I EC	3.6	2.4	4.8
			Rome I DO	13.8	11.5	16.0
			Rome II FC	14.7	12.0	16.0
			Self-report	27.2	18.4	35.4
			Rome I	16.7	12.0	21.0
			Rome II	14.9	8.3	21.1

DD, Disordered defecation; EPOC, Epidemiology of Constipation (study); FC, Functional constipation; NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey; NHIS, National Health Interview Survey.

罗马标准下发病率: 3.6%~27.2%

慢性便秘 Chronic Constipation

Classification

Clinical Assessment

Exclude metabolic/structural causes

Colonic Transit
Anorectal Manometry (ARM), Balloon Expulsion (BE)
Scintigraphic/Barium Defecography

Colonic Transit	(N)	(N)	(AbN)	(AbN)
ARM/BE	(N)	(AbN)	(AbN)	(N)
Functional constipation/ IBS				
Pelvic floor dysfunction				
Pelvic floor dysfunction + Slow-transit				
Slow-transit				

Bharucha AE. Constipation. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2007;21:709-731.

慢性便秘 Chronic Constipation

Classification of 215 patients with functional constipation

STC	18 (8.4)
PFD	164 (76.3)
NTC	23 (10.7)
C-IBS	10 (4.6)
No abnormalities	

Note: STC, slow transit constipation; PFD, pelvic floor dysfunction; NTC, normal transit constipation; C-IBS, constipation-predominant irritable bowel syndrome. Data are numbers (percentages).

Clinic Database from 421 Patients in our hospital

慢性便秘 Chronic Constipation

Studies on Long-Term Follow-Up of Children With Chronic Idiopathic Constipation

Studies	Number of Patients	Age at Diagnosis (years)	Duration of Follow-Up (years)	Favorable Outcome (%)
Loening-Baucke ²	90	≤4	6.9	63
Keuzenkamp-Jansen et al ⁴	137	≤18	4	66
Ehlimy et al ¹⁰	41	≤5	1.5	88
Saiphon et al ¹⁶	48	≤13	6.8	70
Stalano et al ⁴	62	1-11	5	48
Practer and Loader ¹⁹	76	≤16	6	64
Van Ginckel et al ²⁰	418	≥5	5	50-70
van den Berg et al ²⁰	47	≤2	3	70
Present study	45	≤14	10	54

Outcome of Functional Constipation in Childhood: A 10-Year Follow-Up Study

Laurent Michaud, MD, Marie-Dominique Lamblin, MD, Sophie Maitresse, MD, Dominique Turck, MD, and Frédéric Gottsard, MD, PhD

患有便秘的儿童，经长期随访后仍有50%以上存在便秘

Clinical Pediatrics, 2009, 48:26-31.

慢性便秘 Chronic Constipation

4 D's in common

10 D's in elder

- Discomfort
- Depression
- Dollar costs
- Drug toxicity

- Drugs (side effects)
- Defecatory dysfunction
- Degenerative disease
- Decreased dietary intake
- Dementia
- Decreased mobility/activity
- Dependence on others for assistance
- Decreased privacy
- Dehydration
- Depression

• Constipation is associated with significantly lower quality of life and higher psychological distress

Bouras EP. Gastroenterol Clin N Am, 2009, 38:463-480.

慢性便秘 Chronic Constipation

Psychological profiles and quality of life differ between patients with dyssynergia and those with slow transit constipation

Satish S.C. Rao^{8*}, Kara Seaton⁹, Megan J. Miller⁸, Konrad Schulze⁸, C. Kice Brown⁸,

1. Constipated patients with dyssynergic defecation have greater psychological dysfunction and more impaired health-related QOL as compared with patients with STC and control subjects.
2. There are strong correlations between psychological dysfunction and impaired QOL in constipated patients.

- PFD患者较STC有更严重的心理问题，生活质量更低
- 便秘患者与心理问题和生活质量受损存在密切联系

Journal of Psychosomatic Research, 2007, 63 :441- 449

大便失禁 Fecal Incontinence

Study	Population	Sample size (response rate)	Data collection method	Outcome definition	Prevalence (95% confidence interval)
Johanson and Lafferty 1996 [14](USA)	Convenience sample of general-practice patients aged 18-92	586	Anonymous self-administered questionnaire	Any involuntary leakage of stool or soiling of undergarments	Approximately 11% (8.5, 13.5) ^a
Lam et al. 1999 [16] (Australia)	Random sample of Sydney electoral roll, aged over 18	953 (71%)	Anonymous postal questionnaire, core questions validated	At least two of: stool leakage, pad for fecal soiling, incontinence of flatus >25% of the time	15% (12.2, 17.8) ^b
Kalantar et al. 2002 [15] (Australia)	Gender-stratified random sample of Sydney electoral roll, aged over 18	990 (66%)	Anonymous self-administered questionnaire	Unwanted release of liquid or solid faeces at an inappropriate time or place	11.2% (8.8, 13.7)
Sprossolis et al. 2002 [17] (France)	Random stratified cluster sample of nursing-hospitalized adults aged over 18	7196 (72%)	Anonymous self-administered postal questionnaire	Uncontrolled anal leakage of stool over in past 12 months	16.8% (15.9, 17.8) ^c

发病率：11%~16.8%

生活质量问卷 Questionnaires of QOL

- 便秘患者生活质量问卷 (PAC-QOL)
- 简易36项条目 (SF-36)
- 症状自评量表 (SCL-90)
- 大便失禁-生活质量评分 (FI-QOL)
-

便秘患者生活质量问卷 (PAC-QOL):

以下表格为用于评估便秘患者生活质量的问卷。请根据您的实际情况，在表格中的相应位置填写数字。数字越大，表示您的生活质量越好。

以下表格为用于评估便秘患者生活质量的问卷。请根据您的实际情况，在表格中的相应位置填写数字。数字越大，表示您的生活质量越好。	1	2	3	4	5
1. 您对便秘的担忧程度如何？					
2. 您对便秘的困扰程度如何？					
3. 您对便秘的恐惧程度如何？					
4. 您对便秘的回避程度如何？					
5. 您对便秘的忍耐程度如何？					
6. 您对便秘的接受程度如何？					
7. 您对便秘的适应能力如何？					
8. 您对便秘的应对策略如何？					
9. 您对便秘的应对效果如何？					
10. 您对便秘的应对信心如何？					
11. 您对便秘的应对态度如何？					
12. 您对便秘的应对决心如何？					
13. 您对便秘的应对毅力如何？					
14. 您对便秘的应对恒心如何？					
15. 您对便秘的应对耐心如何？					
16. 您对便秘的应对恒心如何？					
17. 您对便秘的应对恒心如何？					
18. 您对便秘的应对恒心如何？					
19. 您对便秘的应对恒心如何？					
20. 您对便秘的应对恒心如何？					

治疗 Treatment ?

非手术治疗

药物
生物反馈
针灸疗法

手术治疗

括约肌成形术
骶神经刺激
人工肛门括约肌

中药 Chinese herb

【澳门亦为五脏使】

附子 干姜 肉桂 藜芦 桂枝 厚朴

肉苁蓉 当归 牛膝 升麻 净泻 枳壳

杏仁 陈皮 青皮 山萸 葛根 黄芩

• 脾肾虚型: 占 50.46%

• 温阳药使用率: 70%

• 有效率: 60%

南京市中医院盆底中心

生物反馈 Biofeedback

Biofeedback Treatment for Functional Anorectal Disorders: A Comprehensive Efficacy Review

Olof S. Palsson,^{1,2} Steve Heymen,¹ and William E. Whitehead¹

This review aimed to critically evaluate the literature on the efficacy of biofeedback for functional anorectal disorders, using these biofeedback applications according to evidence-based guidelines, and make recommendations for this field based on the literature. The Medline and PsycInfo databases were searched to select all papers published from 1975 to 2007 that included the terms "biofeedback" and either "constipation," "pelvic floor dysfunction," "anal incontinence," or "anorectal pain." All full and abstract papers in any language were included. Prospective studies included those that used pelvic floor and/or anal biofeedback as a treatment. Patients in studies that used more than one type of biofeedback or that used biofeedback in combination with other treatments were excluded. Seventy-four studies met the criteria for review. 52 trials in fecal incontinence (FI), 18 in pelvic floor dysfunction (PFD) or functional constipation, and 3 on anorectal pain. Only 20% of studies were controlled outcome trials. Treatment protocols, electrode placements, and outcome measures varied greatly. The overall average probability of successful treatment outcomes for patients treated with biofeedback was 67.2% for functional FI and 62.4% for constipation. There were insufficient data to warrant such calculations for anorectal pain. According to standard efficacy criteria, biofeedback treatment is efficacious for functional constipation and possibly efficacious for anorectal pain. Efficacy data from all applicable studies, we found that success and pain relief is significantly higher for biofeedback treatment than for standard medical care for PFD, functional constipation, and FI ($p < .05$) for both. Biofeedback treatment may therefore be considered as a valuable adjunct to medical management of functional PFD, constipation and incontinence. A number of recommendations for future investigations are made based on the review.

Applied Psychophysiology and Biofeedback, Vol. 29, No. 3, September 2004 (© 2004)

- 治疗排便障碍有效率: **62.4%**
- 治疗大便失禁有效率: **67.2%**
- 对儿童和成人同样有效

生物反馈 Biofeedback

The role of biofeedback in the treatment of gastrointestinal disorders

Giuseppe Chiarioni and William E Whitehead¹

Table 1 Biofeedback therapy for dysynergic defecation: randomized, controlled trials in adults.

Reference	Number of patients (n/m)	Control treatment	Positive outcome	Follow-up
Chiarioni et al. (2006) ⁴²	109 (104/5)	PEG 14.6-29.2 g/day	Major clinical improvement: BF 60% vs PEG 22% (P<0.001)	BF 24 months; PEG 12 months
Heymen et al. (2007) ⁴⁴	84 (72/12)	Diazepam or placebo pill	Symptom relief: BF 70% vs D 23% (P<0.001) vs PP 38% (P<0.017)	3 months all groups, ongoing
Rao et al. (2007) ⁴³	77 (69/8)	Sham feedback or standard therapy	Global satisfaction with symptoms: BF 86% vs SF 46% (P 0.018) vs ST 62% (P=NS)	3 months all groups, ongoing

• 治疗排便障碍有效率: **70%以上**

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, 2008, 5: 371-382

针灸疗法 Acupuncture

CNS

ANS

ENS

针灸疗法 Acupuncture

Fecal incontinence treated with acupuncture - a pilot study

Marco Scaglia ^{1,2,*}, GianGaetano Delaini ³, Ines Destefano ⁴, Leif Hultén ⁵

Conclusion: Acupuncture offers good opportunities for improving fecal incontinence. The mechanism of action is obscure but might be an effect of the "neuromodulation" of the recto-anal function similar to that explaining the favorable results achieved by sacral nerve stimulation. The concomitant regulation of disordered bowel habits may also contribute to the satisfactory results.

- 针灸能明显改善大便失禁的症状，有类似SNS的作用

骶神经刺激 Sacral Nerve Stimulation

- 便秘
- 大便失禁
- 疼痛

骶神经刺激 Sacral Nerve Stimulation

Long-Term Outcome of Sacral Nerve Stimulation for Fecal Incontinence

RESULTS: Fifty-two patients were available for long-term follow-up lasting at least 5 years. Compared with baseline, the Wexner score decreased significantly after definitive implantation (from 15 ± 4 to 5 ± 5 , $P < 0.001$). At least 50 percent improvement in continence was achieved in 74 percent of the patients, and at least 70 percent improvement (median value) was achieved in 50 percent. The mean number of solid/liquid incontinence episodes decreased significantly from $0.5 (\pm 0.5)$ to $0.1 (\pm 0.3)$ per day ($P = 0.004$). Quality of life improved in all domains. The overall mean improvement in SF-36 scores was 39.8 percent. Both mean resting and squeeze anal pressures increased significantly, and maximum volume tolerated decreased significantly.

骶神经刺激治疗远期疗效显著，患者症状减轻，生活质量明显提高

Altomare DF et al. Dis Colon Rectum 2009; 52: 11-17.

骶神经刺激 Sacral Nerve Stimulation

Results of SNS for constipation

Author	No of Patients	Follow-up (mo)	Success (%)	Wexner Constipation Score (B/F)
Malouf et al, 2002 ²⁰⁵	4	8	75	21/9
Ganio et al, 2003 ²⁰⁷	16	12	94.8	14.3/2.7
Kenefick, 2006 ²⁰⁸	4	8	75	21.5/9.2
Holzer et al, 2008 ²⁰⁹	19	11	42	23/8

骶神经刺激治疗便秘有效率：42-94.8%

Pinto RA, et al. Surgery and Sacral Nerve Stimulation for Constipation and Fecal Incontinence. Gastrointest Endoscopy Clin N Am, 2009; 19: 83-116.

骶神经刺激 Sacral Nerve Stimulation

Incidence and Predictors of Complications With Sacral Neuromodulation

Wesley M. White, Joe D. Mobley III, Regula Doggweiler, Cindy Dohmeyer-Dittrich, and Frederick A. Klein

and device variables were examined statistically for evidence of predictive value. From September 2001 to March 2008, 221 patients with a mean age of 48.8 years underwent SNS lead placement for the treatment of intractable urinary urgency/frequency ($n = 121$), urge incontinence ($n = 63$), or urinary retention ($n = 37$). Of this group, 202 patients (91.4%) experienced a $>50\%$ improvement in symptoms and underwent implantable pulse generator placement. At a mean follow-up of 36.9 months, 67 patients (30.3%) had experienced AEs (pain in 6, elective removal in 10, lack of efficacy in 11, trauma in 18, infection in 7, hematoma in 3, and lead migration in 12) requiring 44 lead revisions and 47 implantable pulse generator revisions. The significant predictors of AEs included a history of trauma ($P < .001$), a change in body mass index class ($P < .001$), enrollment in a pain clinic ($P = .008$), the duration of follow-up ($P = .002$), and a history of AEs ($P < .001$).

- 并发症：疼痛、电极移位、损伤、感染、血肿
- 价格昂贵

UROLOGY, 2009, 73: 731-735

人工肛门括约肌 Artificial Anal Sphincter

大便失禁—重度括约肌损伤

人工肛门括约肌 Artificial Anal Sphincter

Results of ABS					
Author	Year	No of Patients	Complication (%)	Explanted (%)	Follow-up (Months)
Cristiansen et al ¹⁰	1999	17	70	41	84
Lehur et al ¹¹	2000	24	17	29	20
Altomare et al ¹²	2001	28	46	18	19
Wong et al ¹⁸	2002	115	86	37	12
Ortiz et al ¹³	2002	22	40	31	28
Devesa et al ¹⁴	2002	53	57	19	26.5
Michot et al ¹⁵	2003	37	—	24	>24
Parker et al ¹⁶	2003	45	51	40	24
Da Silva et al ¹⁷	2004	11	45	0	19
Casal et al ¹⁸	2004	10	60	30 (20 rmp.)	29
La Torre et al ¹⁹	2004	8	25	25	3-40
O'Brien et al ²⁰	2004	7	42	14	6
Melenhorst et al ²¹	2008	33	24	21	17.4

并发症：17%~70%

Pinto RA, et al. Surgery and Sacral Nerve Stimulation for Constipation and Fecal Incontinence. *Gastrointest Endoscopy Clin N Am*, 2009; 19: 83-116.

组织工程学 Tissue engineering

- 综合应用工程学和生命科学的基本原理、基本理论、基本技术和基本方法
- 在体外预先构建一个有生物活性的种植体，然后植入体内，修复组织缺损，替代组织、器官的一部分或全部功能，或作为一种体外装置，暂时替代器官部分功能
- 达到提高生活、生存质量，延长生命活动的目的。
- 核心：活的细胞、可供细胞进行生命活动的支架材料以及细胞与支架材料的相互作用

结直肠外科医生的天职
重视结直肠肛门功能
提高生活质量

Thank you

盆底功能障碍的诊断与治疗进展

南京中医药大学第三附属医院
全国中医肛肠医疗中心 盆底疾病中心
丁曙晴

盆底是一个整体

盆底功能障碍性疾病

盆底功能障碍所致便秘涉及学科，主要包括：泌尿（前盆）、妇科（中盆）和肛肠（后盆），还需要医学影像、康复、消化、中医、针灸、精神心理等多个学科，形成了以整体观和多学科合作为指导的临床实践。

盆底功能障碍性疾病

盆底功能障碍所致便秘的病因

Hippocrates: 平衡表示健康, 失衡预示疾病。

盆底功能障碍所致便秘的症状

盆底生物反馈

- What :** 什么是盆底生物反馈
- Indication :** 适应证
- Protocol :** 训练方案
- Result from evidence :** 循证结果

什么是盆底生物反馈

1. 肛门传感器 调节和训练大脑控制排便的技术

2. 信号放大加工

3. 信号屏幕显示 BIOFEEDBACK

- 将盆底肌肉运动信号，通过屏幕显示，让患者感知（认识错误）
- 建立大脑和盆底肌之间的外部条件反射通路，部分代偿或训练已经受损的内部反馈通路。

什么是盆底生物反馈

1950年代	1960年代	1970年代	1970年代
心理生理学	应用心理生理学	生物反馈	盆底生物反馈

- 1967年Miller等证明，自律性神经系统的活动如心率、血压、腺体分泌等可通过“学习”条件反射产生双向调节。
- 1973年Birk提出生物反馈疗法及“行为医学”概念。
- 1974年Engel用三球囊压力测定模拟排便生理反射，并用此装置经肛门反馈治疗大便失禁，同年Bleijenbergh开始采用盆底肌电反馈技术治疗便秘。

盆底生物反馈的适应症

肛肠科 <ul style="list-style-type: none"> 大便失禁(建议作为金标准) 出口梗阻性便秘 肠易激综合征 	泌尿科 <ul style="list-style-type: none"> 尿失禁 间质性膀胱炎 	妇科 <ul style="list-style-type: none"> 性交痛 外阴前庭综合征 外阴痛
---	--	---

共同问题

- 肌性盆底痛
- 盆底肌协同障碍
- 盆腔器官脱垂

<http://www.aapb.org/>

盆底生物反馈的适应症

肌肉: 过度活动或活动不足

神经: 部分阴部神经或骶神经功能障碍

心理精神

The American Neurogastroenterology and Motility Society and the European Society of Neurogastroenterology and Motility

Neurogastroenterology & Motility

Recommendation 1: Biofeedback therapy is recommended for the short-term and long-term treatment of constipation with dyssynergic defecation (DD). Level I, Grade A.

Recommendation 2: Biofeedback therapy is recommended for the short-term and long-term treatment of Fecal Incontinence (FI). Level II, Grade B.

Recommendation 3: Biofeedback therapy may be useful for the short-term treatment of Levator ani syndrome (LAS) with FD (Level II, Grade B) and idiopathic rectal stress syndrome (IRSS) with FD (Level II, Grade C), but the evidence is low.

Recommendation 4: Biofeedback therapy is not recommended for the routine treatment of children with Functional Constipation, with or without overflow. II, Level I, Grade D.

- 盆底弛缓所致便秘 1A
- 大便失禁 2B
- 肛提肌综合征2B和孤立性溃疡综合征3C

盆底生物反馈最佳适应症

最佳适应症

- 盆底松弛型, 不伴有明显盆腔脏器脱垂
- 盆底弛缓型非完全神经源性
- 精神正常, 认知良好, 有较强的治疗愿望
- 能配合生活、饮食习惯的改变

丁曙晴, 肛肠动力学检查在盆腔脏器脱垂病情评估中的应用及临床价值 中国医刊, 2014, 49 (4): 6-7.

盆底生物反馈的机理

通过装置建立外部的反馈通路，部分代偿或训练已经受损的内部反馈通路，重建条件反射的过程。

脑肠轴理论

- 神经系统对胃肠运动的调控通过CNS, ANS 和ENS 3个层次;
- 脑-肠轴: 在不同层次将胃肠道与中枢神经系统联系起来的神经-内分泌网络;
- 不同层次脑肠轴神经调控过程也是生物反馈治疗的通路

倪敏, 丁文江, 丁曙晴. 神经调节在功能性胃肠病中的作用及其研究进展. 世界华人消化杂志, 2011.

盆底生物反馈需要多学科团队

- 结直肠
- 妇科
- 泌尿科或男科
- 消化科
- 康复科
- 心理生理学 / 行为医学
- 治疗师 (行为疗法, 物理治疗)
- 生物反馈技师
- 失禁顾问
- 护士
- 社会工作者 (义工)
- 营养师

方案设计来源于诊断

病史

查体

盆底相关检查:

- 测压、肌电(盆底表面肌电)、尿动力、盆底超声、排粪造影、四重造影、动态磁共振等

综合评价, 分析病因:

- 部分疑难患者需要多学科联合评估

筛选出合适纳入治疗的患者

方案设计来源于诊断

查体

肛门直肠: 肌肉张力, 持续收缩能力, 快速收缩能力, 肌肉协调性, 脱垂, 耻骨直肠肌牵拉痛和阴部神经扳机点(坐骨棘)

阴道: 子宫骶骨韧带, 会阴体, 脱垂等

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

- 无创技术
- 经阴道/肛门表面电极记录 盆底横纹肌潜在运动电位
- 利用模拟信号转化、滤波、信号整合等技术处理数据
- 建立数据库
- 应用于盆底肌功能评估, 帮助指导个性化康复方案

探头

采集器

软件

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

肌张力、肌力和肌电活动的关系

- **肌张力:** 肌肉安静放松状态下的紧张度。
- **肌力:** 指肌肉收缩的力量。
- **肌电活动:** 肌肉各种状态下的电生理活动, 判断神经和肌肉的功能状态。

高张力和过度肌电活动

无关

低张力和肌电活动减弱

控制良好, 肌张力正常。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

功能	盆底肌纤维类型
支持(子宫, 膀胱和肠道) 长时间保持张力	I型(深色)需氧的慢反应型肌, 耐疲劳
性 完成短而有力的收缩	II型(浅色)厌氧的快反应型肌, 不耐疲劳
括约	I型和II型混合

- 大约 2/3 盆底肌是慢反应型肌;
- 无法将快反应肌训练成慢反应肌, 反之亦然。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

评估方案- Glazer Protocol

- Howard Glazer, Ph.D 纽约康奈尔医学院教授
- 擅长女性阴道痛及尿失禁等盆底功能障碍的诊断和治疗
- 1995年开始对盆底功能障碍患者表面肌电数据进行分析
- 2005年提出盆底肌评估方案 (Glazer Protocol)
- 计算机表面肌电信号处理设备和软件程序指导下的一系列肌肉活动和检测指标
- 收集表面肌电信号，建立数据库
- 设立个性化康复方案，用于临床诊断和治疗

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

正常表面肌电五步骤的意义

- 静息状态基线值:** 肌肉活动之前能量消耗的水平; 基线升高多由组织学、情绪因素或两者共同引起
- 肌肉募集的速度:** 指肌肉收缩的速度, 取决于肌纤维组成及特性、神经分布比例及肌肉长度; 快肌和慢肌纤维传导速度不同
- 收缩波幅:** 肌肉募集的综合, 与肌肉体积、神经支配、综合运动单位及疲劳适应度呈正比
- 疲劳度:** 组织灌注不充分、能量耗尽及代谢物堆; 当肌肉以10%-50%最大自主力量收缩时, 肌力增加足以压迫小动脉, 使肌肉缺氧和能量消耗
- 恢复到基线:** 如不能恢复到基线, 会影响活动后神经肌肉兴奋性, 造成本体感觉受损。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

主要检测指标

1. 振幅 (AVG)
2. 标准差 (SD)
3. 变异系数 (CV, $CV=SD/AVG$)
4. 肌肉收缩募集/恢复时间 (Onset)
5. 中值频率 (MF): 收缩时能量密度, 运用傅立叶变换算法 (FFT) 公式分析频谱获得。

变异系数: 反应快、慢型肌运动是否协调, 代表肌肉运动的稳定性。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

Glazer方案在盆底痛领域的应用

外阴前庭炎综合征

- 静息波幅升高
- 静息状态变异系数升高

外阴痛

- 静息波幅升高
- 收缩波幅下降
- 收缩状态变异系数升高

慢性盆腔痛(男性)

- 静息波幅升高
- 收缩状态变异系数升高

• Glazer HJ. Electromyographic comparison of the pubis. Thesis in Women with Dyspareunia. Unpublished dissertation, Cornell University, Ithaca, NY, 1995.
 • Glazer HJ. Power. Four Minute Surface Electromyography: Rationale and Clinical Application. Northridge, CA: 1997.
 • Glazer HJ. The modified Glazer method: electromyographic protocol for the identification, assessment and stabilization of pelvic floor dysfunction in urogynecologic incontinence. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2002.
 • Glazer HJ. Glazer HJ. Power. Four Minute Electromyography. In: The Pelvic Floor. Pelvic Floor Dysfunction. A Case Based Study. Saunders Elsevier, 2006.

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

• 盆底表面肌电-正常值的研究 (共116例)

研究时间	研究方式	研究对象 (无症状人群)
2009.05~ 2010.07	多中心 (南京市中医院 沈阳肛肠医院 湖州肛肠医院)	116例, 男47例, 女69例 年龄21~60 (35.57±13.16) 岁

★主要排除便秘、大便失禁、肛门直肠痛、尿失禁、外阴阴道痛、盆腔脏器脱垂等盆底功能障碍性疾病及有器质性疾病者。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底表面肌电正常值

检测阶段	检测指标	性别	正常范围	P值
前基线	波幅(μV)	男	3.94±2.03	0.195
		女	3.99±1.87	
		变异系数	0.19±0.08	
快速收缩	收缩反应时间(s)	男	1.90±0.37	0.963
		女	1.89±0.37	
		变异系数	0.19±0.09	
持续收缩	最大收缩波幅(μV)	男	75.86±34.73	0.000
		女	47.34±19.31	
		变异系数	0.31±0.07	
耐久收缩	收缩波幅(μV)	男	33.08±23.55	0.000
		女	26.32±11.85	
		变异系数	0.31±0.07	
后基线	波幅(μV)	男	0.31±0.07	0.759
		女	0.30±0.08	
		变异系数	0.28±0.08	
快速收缩	收缩反应时间(s)	男	34.30±19.67	0.653
		女	23.19±11.82	
		变异系数	0.29±0.09	
持续收缩	最大收缩波幅(μV)	男	86.87±10.37	0.430
		女	86.18±11.79	
		变异系数	0.29±0.09	
耐久收缩	收缩波幅(μV)	男	84.30±19.67	0.000
		女	23.19±11.82	
		变异系数	0.28±0.08	
后基线	波幅(μV)	男	87.18±12.14	0.306
		女	85.46±12.17	
		变异系数	0.24±0.18	
快速收缩	收缩反应时间(s)	男	3.69±2.09	0.084
		女	0.24±0.18	
		变异系数	0.21±0.12	

薛雅红,丁雪峰.无症状人群盆底表面肌电的研究及其临床意义.临床外科杂志,2012.

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底表面肌电正常值-不同年龄段比较

检测阶段	检测指标	21~30岁 (n=68)	31~40岁 (n=102)	41~60岁 (n=112)	≥61岁 (n=26)	P值
前基线	波幅(μV)	3.63±1.96	4.59±1.96	3.57±1.94	4.78±1.88	0.300
	变异系数	0.19±0.06	0.18±0.03	0.24±0.11	0.23±0.10	0.160
快速收缩	收缩反应时间(s)	1.94±0.38	1.62±0.42	2.09±0.27	2.11±0.31	0.662
	最大收缩波幅(μV)	67.46±30.23	84.20±33.05	59.54±32.22	55.07±26.91	0.058
持续收缩	收缩波幅(μV)	30.46±16.41	39.41±15.96	23.21±13.40	24.22±13.48	0.610
	变异系数	0.31±0.11	0.27±0.05	0.39±0.10	0.40±0.11	0.699
耐久收缩	收缩波幅(μV)	23.17±11.63	30.94±9.48	20.51±13.16	21.75±13.47	0.172
	变异系数	0.27±0.09	0.25±0.07	0.35±0.07	0.38±0.13	0.600
后基线	波幅(μV)	86.25±11.39	87.70±11.91	90.08±16.43	85.38±11.51	0.704
	变异系数	4.08±2.79	4.84±2.79	2.75±1.45	3.93±2.14	0.147
快速收缩	收缩反应时间(s)	0.22±0.15	0.30±0.28	0.24±0.08	0.22±0.12	0.750
	变异系数	0.22±0.15	0.30±0.28	0.24±0.08	0.22±0.12	0.750

- 1.收缩波幅:不同年龄段阶段男性明显大于女性;
- 2.快速收缩反应时间:随年龄增加延长;
- 3.持续收缩:随年龄增加收缩波幅下降、变异系数升高。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底表面肌电异常参考值

- 研究时间: 2009.7~2012.5
- 研究单位: 南京市中医院盆底中心
- 研究对象: 盆底失弛缓综合征

功能性肛门直肠痛

盆底松弛综合征

	n	M	F	Age(y)
盆底失弛缓综合征	73	31	42	18-40 (28.04±5.83)
功能性肛门直肠痛	146	45	101	20-79 (49.33±12.37)
盆底松弛综合征	145	12	133	35-80 (56.43±10.29)

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底失弛缓综合征

检测阶段	检测指标	盆底失弛缓 (n=73)	正常组 (n=80)	t值	P值
前基线	波幅(μV)	4.93±3.01	3.80±1.97	2.723	0.007
	变异系数	0.18±0.07	0.19±0.05	0.860	0.391
快速收缩	收缩反应时间(s)	1.85±0.39	1.91±0.40	0.953	0.342
	最大收缩波幅(μV)	59.15±28.14	69.95±31.05	2.245	0.026
持续收缩	收缩波幅(μV)	27.13±16.49	31.41±16.34	1.607	0.110
	变异系数	0.38±0.13	0.31±0.11	3.147	0.002
耐久收缩	收缩波幅(μV)	86.83±18.25	85.44±10.44	0.581	0.562
	变异系数	24.05±14.58	23.85±11.65	0.092	0.927
后基线	波幅(μV)	0.35±0.14	0.28±0.10	4.094	0.000
	变异系数	85.53±19.81	86.29±11.36	0.292	0.771
快速收缩	收缩反应时间(s)	4.30±2.49	4.21±2.27	0.766	0.445
	变异系数	0.22±0.11	0.23±0.17	0.222	0.824

薛雅红,丁雪峰,丁文江,等.盆底失弛缓综合征患者盆底表面肌电的改变及临床意义.世界华人消化杂志,2012,20(12):1025-1029.

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底失弛缓综合征-与年龄相关性

检测阶段	检测指标	t值	P值
前基线	波幅(μV)	-0.229	0.051
	变异系数	-0.213	0.071
快速收缩	收缩反应时间(s)	-0.016	0.891
	最大收缩波幅(μV)	0.003	0.981
持续收缩	收缩波幅(μV)	-0.162	0.170
	变异系数	0.359	0.002
耐久收缩	收缩波幅(μV)	0.029	0.808
	变异系数	-0.131	0.271
后基线	波幅(μV)	0.274	0.019
	变异系数	0.080	0.500
快速收缩	收缩反应时间(s)	-0.108	0.361
	变异系数	-0.109	0.359

- 随着年龄增长,变异系数升高。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底失弛缓综合征

- 静息波幅大于无症状组: 静息状态盆底肌过度活动
- 最大收缩波幅小于无症状组: 快型肌募集功能差
- 变异系数大于无症状组: 盆底肌(快、慢型肌)运动不协调
- 变异性与年龄呈正相关: 随着年龄的增加,失弛缓患者肌肉运动的协调性越来越差

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

功能性肛门直肠痛

深部肌电信号参数	无症状组 (n=125例)	FAP组 (n=146例)	t值	P值	
前基线	平均波幅	4.10±2.14	4.67±3.24	1.687	0.093
	变异系数	0.20±0.08	0.18±0.08	2.139	0.053
快速收缩	起始时间	1.98±0.37	1.96±0.37	0.325	0.742
	最大波幅	66.79±31.03	5.65±34.46	2.559	0.011
	平均波幅	29.21±15.59	24.19±14.85	2.711	0.007
持续收缩	变异系数	0.35±0.12	0.40±0.13	3.037	0.002
	中值频率	85.40±10.20	88.54±11.70	2.336	0.020
	平均波幅	23.24±12.00	21.42±13.02	1.186	0.237
耐久收缩	变异系数	0.31±0.12	0.37±0.15	3.471	0.001
	中值频率	86.17±11.85	88.33±14.09	1.358	0.176
	平均波幅	4.20±2.36	4.37±3.10	0.515	0.607
后基线	变异系数	0.23±0.15	0.21±0.12	1.266	0.207

• 收缩波幅降低，变异系数升高。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

功能性肛门直肠痛

采用受试者工作曲线(ROC)寻求特异性指标

目的: ROC曲线评价盆底表面肌电对功能性肛门直肠痛的临床诊断价值

结果:	曲线下面积	灵敏度	特异度
持续收缩-变异性		70%	72.8%
耐久收缩-变异性		73.3%	70%
结论:	收缩阶段的 变异系数 对功能性肛门直肠痛有较好的临床诊断价值

薛雅红, 丁珊珊. 受试者工作曲线评价盆底表面肌电对功能性肛门直肠痛的诊断价值. 世界华人消化杂志.

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

功能性肛门直肠痛

- 前基线各指标间差异无统计学意义
- 快速收缩 波幅小于无症状组: **快速收缩时快型肌不能充分募集**
- 持续收缩平均收缩波幅小于无症状组, 中值频率大于无症状组: **慢型肌募集差**
- 持续及耐久收缩变异系数大于无症状组: **保持收缩时FARP患者快、慢型肌协调性差**
- 收缩阶段的**变异系数**对功能性肛门直肠痛有较好的临床诊断价值

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底松弛综合征

检测阶段	检测指标	正常组 (n=110)	盆底松弛 (n=145)	t值	P值
前基线	波幅(μV)	4.10±2.14	3.27±1.97	3.310	0.001
	变异系数	0.20±0.08	0.17±0.09	3.295	0.001
快速收缩	收缩反应时间(s)	1.98±0.37	1.98±0.34	0.124	0.901
	最大收缩波幅(μV)	66.79±31.03	36.31±17.86	9.686	0.000
持续收缩	收缩波幅(μV)	29.21±15.59	17.73±9.26	7.208	0.000
	变异系数	0.35±0.12	0.38±0.11	1.989	0.048
	中值频率(Hz)	85.40±10.20	89.66±16.79	2.556	0.011
耐久收缩	收缩波幅(μV)	23.24±12.00	15.40±8.03	6.204	0.000
	变异系数	0.31±0.12	0.35±0.13	2.189	0.029
	中值频率(Hz)	86.17±11.85	90.47±17.82	2.363	0.019
后基线	波幅(μV)	4.20±2.36	3.22±2.07	3.584	0.000
	变异系数	0.23±0.15	0.22±0.17	0.817	0.414

慢型肌和快型肌均收缩活动减弱; 肌肉稳定性差; 不耐疲劳。

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

盆底表面肌电特点小结

- 正常人**
 - 变异性: 无性别差异, 随年龄增长变异性大
- 三种盆底疾病的共性**
 - 盆底肌收缩变异性差, 提示慢性疲劳。
 - 盆底肌电活动过度或不足;
 - 慢型肌稳定性差;
 - 快型肌募集功能差;
 - 快慢型肌运动不协调等

方案设计来源于诊断

盆底表面肌电

基于盆底表面肌电

诊断 特异性的诊断指标

治疗 分析数据
指导选择生物反馈方案

疗效评估 与疗效密切相关的指标
进一步完善治疗

盆底生物反馈 训练目标

定位训练肌肉

让患者感知盆底肌；可使用另外通道显示腹部臀部肌肉或内收肌不参与运动；

- 特异性训练

强调只收缩盆底肌，重在质量而非数量，即不追求波幅的升高；
- 区分肌纤维类型
- 标准化训练

达到静息基线正常；快速和间断收缩肌肉，募集的速度、收缩波幅及收缩后恢复到基线的速度等。

1. 稳定性

2. 敏感性

训练目的

3. 协调性

4. 肌力

根据患者的主要异常制定训练方案

盆底生物反馈 治疗模式

放松训练

稳定性训练 (Kegel模板)

触发电刺激

耐力训练

盆底生物反馈 治疗模式 训练稳定性

- 模板训练
 - 根据评估时患者的基础值设定训练难度
 - 根据评估制定患者的训练进程
- 配合家庭kegel训练
 - 根据医院内治疗师指导找准感觉
 - 放松10秒持续收缩10秒，每日2次，每次60次

Biofeedback for Fecal Incontinence: A Randomized Study Comparing Exercise Regimens

CONCLUSIONS: Patients attending this biofeedback program attained significant improvement in the severity of their fecal incontinence and in their quality of life.

Although introduction of exercise regimens had little impact on fecal incontinence severity or patients' quality of life, positive outcomes were observed in patients.

Dis Colon Rectum 2011; 54: 846-856

盆底生物反馈 治疗模式 训练协调性

- 正确训练盆底肌
- 注意臀大肌、腹肌、内收肌和闭孔内肌等辅助肌不能过度参与训练
- 稳定性训练
- 与以往方案训练Valsava动作不太一致

盆底生物反馈 治疗模式 训练感觉功能-单纯电刺激

- 盆底痛: 10-12Hz
- 急迫性失禁: 20 Hz
- 张力性失禁: 50-100 Hz
- 尿滞留或便秘: 200 Hz

Diseases of the Colon & Rectum

Randomized, Controlled Trial of Anal Electrical Stimulation for Fecal Incontinence

Chaitkin, Steven, Ph.D., M.D.,¹ Borgia-Giblin, M.D.,² Shkolnik, A., Karam, M.D., F.R.C.P.³

¹Division of Gastroenterology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; ²Department of Surgery, Brigham Young University, Provo, Utah; ³Department of Surgery, University of Liverpool, Liverpool, England

(P = 0.001). CONCLUSIONS: Eight weeks of anal electric stimulation was rated by patients as having improved their bowel control to a modest extent. There was no statistically significant difference detected between the groups, suggesting that 1 Hz was as effective as 85 Hz. This raises the possibility that the main effect is not sphincter contraction but sensitization of the patient to the anal area, or simply the effect of intervening per se. Home electric stimulation is a relatively cheap and generally well-tolerated therapy in the conservative treatment of fecal incontinence. (Key words: Fecal incontinence; Electrical stimulation; Conservative management)

盆底生物反馈 治疗模式 训练感觉功能-触发电刺激

- 刺激强度: 患者感觉舒服为度
- 根据前三次收缩将会测定一个阈值，之后患者每次收缩达到阈值就会触发一次肌电刺激，收缩/放松交替进行，治疗持续15min。

Type	Threshold	Setup up	Setup down	Pulse rate	Pulse width
Stimulation phase 1	45000 X300	1	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 2	60100 X600	2	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 3	45000 X300	1	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 4	45000 X300	1	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 5	45000 X300	1	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 6	60100 X600	2	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 7	50000 X300	2	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 8	60100 X600	2	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 9	45000 X300	1	1	4000	2000 X1
Stimulation phase 10	50000 X300	2	1	4000	2000 X1

盆底生物反馈

治疗模式 训练感觉功能—小球囊训练

- 根据测试决定注水或注气量
- 根据训练目的决定逐渐增量或减量

充胀感觉反馈训练器

方案设计

- 随着病理生理异常的发现
 - 中国人正常值及各种盆底功能异常数据库
- 随着治疗师水平的提高
 - 盆底生物反馈治疗师培训及认证并多学科合作
- 随着对使用设备的了解及熟练
- 随着对病人的了解和理解

方案设计

梅奥医院

短期强化治疗
45min/次, 3次/天, 2周为1个疗程
治疗师全程指导
家用训练器根据方案训练并定期随访

明尼苏达大学

1次/周, 4次一疗程
配合家庭训练

康奈尔大学

家用训练器
根据训练方案自行训练
每2周进行盆底表面肌电评估测试

方案设计

便秘-爱荷华方案

- 第一阶段：纳入病人
 - 面谈/排便日记
 - 主观评估 (视觉评分量表)
 - 腹式呼吸练习
- 第二阶段：积极阶段- 3月 (6次训练)
 - 每2周就诊1次 - 60-90 min/次
 - 测压, 结肠传输时间, 排便日记, 视觉评分量表
 - 家庭训练装置
- 第三阶段：巩固强化
 - 6周、3月、6月

方案设计

我们的方案

- 治疗模式: 触发电刺激、Kegel模板训练
- 训练时间: 1次/天, 30min/次, 5次/周
- 疗程: 10次一疗程, 常规治疗2个疗程
- 配合: 针灸、中药、家庭训练
- 随访: 定期盆底表面肌电评估

方案设计

具体制定基于sEMG评估-以功能性肛门直肠痛(FAP)为例

- 单纯变异性的升高
 - Kegel训练 (收缩10s, 放松10s)
- FAP 收缩变异性的升高
 - 静息基线升高
 - 放松训练(10-15min)
 - Kegel训练(收缩10s, 放松10s)
 - 静息基线降低
 - 单纯电刺激
 - Kegel训练(收缩10s, 放松10s)
 - 收缩波幅降低
 - 触发电刺激
 - Kegel训练(收缩10s, 放松10s)

我们的研究结果

• 时间: 2009.5~2012.9

治疗疾病	例数	男	女	年龄
盆底弛缓综合征	76	35	41	19-42岁
盆底松弛综合征	80	0	80	45-76岁
功能性肛门直肠痛	80	32	48	20-70岁

• 生物反馈治疗方案

- 盆底弛缓: 放松训练+Kegel训练
- 盆底松弛: Kegel训练+电刺激
- 功能性肛门直肠痛: Kegel训练+(放松训练、电刺激)

我们的研究结果

盆底失弛

76例盆底失弛缓综合征治疗1疗程前后比较

表面肌电信号参数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
前基线	平均波幅: 5.47±3.66	3.00±1.77	4.192	0.000
	变异系数: 0.19±0.07	0.15±0.05	2.222	0.033
快速收缩	起始时间: 1.98±0.32	2.10±0.33	1.730	0.093
	最大波幅: 53.85±35.33	43.13±34.65	1.433	0.161
持续收缩	平均波幅: 25.09±16.14	23.43±19.11	0.505	0.617
	变异系数: 0.40±0.12	0.31±0.12	4.280	0.000
	中值频率: 93.12±15.15	97.05±19.32	0.987	0.331
耐久收缩	平均波幅: 21.61±14.63	21.55±17.38	0.020	0.984
	变异系数: 0.38±0.12	0.30±0.13	3.155	0.003
	中值频率: 93.30±13.93	97.80±18.94	1.191	0.242
后基线	平均波幅: 4.79±3.10	3.17±1.60	2.958	0.006
	变异系数: 0.23±0.17	0.22±0.20	0.333	0.741

• 静息基线降低, 变异性降低

- 杨**, 男, 74岁, 排便不畅3年余
- 3~4天排便1次, 排便时间约30分钟, 费力, 大便干多为硬块, 轻度腹胀感, 小便等待时间延长
- 肛门指诊: 力排肛直角变小
- 结肠传输试验: 未见异常
- 排粪造影: 直肠粘膜内套叠
- 诊断: 盆底失弛缓

- 丁**, 男, 51岁, 排便困难5年余, 加重1年。有便意, 伴不净感, 药物辅助排便, 排便时间30分钟以上, 伴腹胀, 肛门梗阻感明显。
- 诱发电位: 左侧骶部N诱发电位潜伏期延长。
- 肛门压力测定: 最大收缩压降低, 排便弛缓反射上升相。
- 诊断: 盆底失弛缓

我们的研究结果

盆底

80例盆底松弛综合征治疗1疗程前后比较

表面肌电信号参数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
前基线	平均波幅: 3.51±2.37	3.24±2.20	0.790	0.433
	变异系数: 0.16±0.05	0.18±0.11	1.101	0.278
快速收缩	起始时间: 2.00±0.37	1.90±0.35	1.130	0.266
	最大波幅: 34.08±19.63	42.09±19.33	2.092	0.043
持续收缩	平均波幅: 17.09±8.79	22.11±11.27	2.469	0.019
	变异系数: 0.37±0.11	0.33±0.09	2.679	0.010
	中值频率: 90.43±25.29	88.70±12.77	0.404	0.688
耐久收缩	平均波幅: 15.39±7.42	18.33±9.78	1.798	0.080
	变异系数: 0.35±0.13	0.30±0.11	2.229	0.032
	中值频率: 91.33±26.39	90.07±13.97	0.273	0.787
后基线	平均波幅: 3.82±2.82	2.89±1.93	1.744	0.079
	变异系数: 0.21±0.13	0.23±0.19	0.387	0.701

• 收缩波幅升高, 变异性降低

- 张**, 女, 57岁, 排便困难15年。
- 无便意, 需辅助排便, 费力, 轻微腹胀, 排便不尽感, 肛门梗阻感, 每次排便20分钟, 硬块散在或成条便, 矢气多, 咳嗽小便溢出。
- 结肠传输试验: 正常。
- 肛管直肠测压: 静息压和收缩压下降。
- 三维动态超声: 直肠前突、直肠粘膜套叠
- 诊断: 盆底松弛

脱垂性疾病与便秘的研究与治疗进展

崔焱辉

直肠脱垂的临床特点

男 6:1 女

发病年龄

- 女性50岁以上高发
- 男性发病高峰为40岁

直肠脱垂5大病理因素

其他致病因素

- 神经病变
- 结缔组织病变
- 多产妇

Tou S, Brown SR, Nelson RL. Surgery for complete (full-thickness) rectal prolapse in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD001758. DOI: 10.1002/14651858.CD001758.pub3.

直肠脱垂 vs. 粘膜脱垂

直肠脱垂相关病变

- 盆底下降
- 肠疝
- 直肠前突
- 膀胱脱垂
- 子宫阴道脱垂
- 便秘 (25%)
- 肛门失禁 (75%)

直肠前突

肠疝

直肠脱垂的手术选择

- 肛门环缩术：已成为历史
- 经腹直肠固定术：
- 肠切除直肠固定术
- 经腹直肠游离
- 经会阴手术：Altemeier
Delorme
经肛吻合器技术

经肛吻合器技术

- 经肛吻合器技术
 - STARR
 - TSTARR+
- 适应症：
 - 脱垂不超过5cm

经肛门吻合器直肠切除术 (STARR)

STARR治疗直肠脱垂

- 不足：
 - 相对较差的视野和受限的钉仓容积
 - 技术难度较高
 - 钉合线间存在黏膜唇边，增加出血风险
 - 两把吻合器，费用较高

直肠脱垂术式的新选择 — TSTSTARR+术

2012年，意大利Naldini教授，联合8家医疗中心开展TSTSTARR+术，治疗脱垂性痔病。

器械

- 苏州天臣公司新近推出的36mm大容量、大口径吻合器。

TOUCHSTONE

Enlightening for the future...

大视窗™
- 直视可控切除所有脱垂组织

大口径™
- 低位切除所有脱垂组织

大容量™
- 容纳更多切除组织

资料与方法

■ 病例入选标准：

- 脱垂不超过5cm；
- 年龄在18~65岁之间；
- 肛门无明显畸形者；
- 签署知情同意书。

资料与方法

■ 手术禁忌症：

- 合并前盆/中盆外脱垂；
- 伴随肠道器质性疾病者：肠癌、炎症性肠病
- 智力障碍或有精神病史者等。

资料与方法

- ◆ 第一终点指标
 - ◆ 成功率（或治愈率）
 - ◆ Wexner失禁评分
- ◆ 第二终点指标
 - ◆ 操作时间
 - ◆ 术中出血量
 - ◆ 切除标本厚度

手术操作要点

- 术前晚常规机械灌肠
- 腰麻 截石位

手术操作要点

麻醉后脱垂情况

实验

脱垂组织牵拉

手术操作要点

- 降落伞缝合：在脱垂组织最低平面（2、4、6、8、10、12点）作降落伞，并将10、12、2点，2、4点，4、6、8点，8、10点牵引线分别组合

手术操作要点

将缝线分别从四个视窗内牵出

预防副损伤，女性患者在激发紧吻合器前，一定配合阴道指检(或辅以阴道拉钩)，以免阴道后壁损伤而引发直肠阴道瘘

手术操作要点

缝扎活动性出血点

切除标本

视频

切除标本

切除标本的HE染色 (10×10倍)

■所有切除标本均见肠外脂肪颗粒。

结果

- 2014年2月至2015年08月, 14例完成系统随访 (男性8例, 女性6例)。
- 平均年龄51.4(18~79)岁。
- 平均发病年龄22.7 (1~70) 年。
- 平均脱垂长度3.7(1.5~5)cm。
- 平均随访时间10.6 (2~20)月。

结果

- 术中平均出血量8.5 (3~15) ml.
- 平均手术时间28(25~45) min.
- 平均住院时间8.0 天。
- 切除标本
 - 平均体积10.6(9.6~16.5) cm³
 - 平均宽度6.2 (4.5~7.2)cm.

结果

- 随访期间无脱垂复发
- 所有患者术前均有不同程度的肛门失禁
 - 10 例患者术后失禁症状缓解 Wexner失禁评分(3.0 vs.14.1, P<0.01)
 - 4例患者失禁症状无明显改变

结果

并发症	例数
直肠周围脓肿	0
继发性出血 (术后3-7d)	0
直肠狭窄	0
肛门疼痛/坠胀	3
直肠阴道瘘	0
吻合口裂开	0

结论

- 通过严格筛选病人, 应用 TSTstarr+ 治疗轻度直肠脱垂是安全、简单、有效的。

便秘的影像学诊断进展

杨光钊

背景

- 便秘是一种常见疾病，受多种因素影响，如膳食结构、精神、社会因素等。
- 女性远多于男性。
- 多为功能性排便障碍。
- 诊治需多学科共同合作完成；难治性便秘联合门诊（消化科，肛肠科，影像科，精神科，营养等）。

影像诊断

放射科能做什么？

通过多种影像学检查，提供结肠传输、盆底排便障碍的客观依据。

结肠传输试验

结肠传输时间的测量是评价结肠功能紊乱的基本及主要工具。可据标志物的分布及排出率，来判断是否存在结肠慢传输异常。

影像诊断

X线排便造影

- 优点：自然排便体位；可动态观察
- 缺点：有辐射；盆底直肠周围软组织未能显示

影像诊断

动态磁共振排便造影

- 随着成像技术的发展，上世纪90年代开始磁共振成像大幅增多，这种检查形式得到医生和患者接受。
- 具有极好的软组织对比和多平面成像功能 能提供充分的盆底功能和结构信息。
- 动态成像，无辐射。

检查方法

- 需要肠道准备，检查前2天流质饮食；
- 扫描范围覆盖整个盆腔，扫描包括常规横断位的T2WI、T1WI，矢状位以及冠状位T2WI/脂肪抑制像；
- 肛门内注入含GDPA2m的玉米糊约300ml，患者仰卧位，使用快速扰相梯度回波序列（FSPGR）对患者静息、提肛、力排时的盆底结构进行矢状位成像。

盆底解剖结构

- 正常盆底“悬挂结构”是由骨结构，肌肉，韧带相互作用形成。
- 盆底分为三腔室，对应于典型的临床症状或病理改变：前腔室（下尿路症状，膀胱脱垂，尿失禁）；中腔室（阴道穹窿或子宫脱垂）；后腔室（便秘，大便失禁，直肠脱垂）

盆底解剖结构

From: Jaap Stoker, MD, PhD. Pelvic Floor
Imaging. Radiology 2001; 218:621-641

盆底解剖结构

Figure 6. (a) Transverse T2-weighted fast spin-echo (2.826/120) MR image obtained with an endovaginal coil and (b) corresponding drawing in an asymptomatic 31-year-old female volunteer show the vaginal wall (VW), puborectal muscle (PR), urethral smooth muscle (SM) and striated muscle (ST), urethral mucosa and submucosa (MS), anorthospic/parapnevic ligament (LP) and parapnevic ligament (PU), anoectum (A), and internal anal sphincter (IS).

From: Jaap Stoker, MD, PhD. Pelvic Floor Imaging. Radiology 2001; 218:621-641.

动态磁共振排便造影

● 正常影像表现

动态磁共振排便造影

● 常见排便异常影像表现:

- 盆底痉挛综合征
- 耻骨直肠肌综合征
- 直肠突出
- 会阴下降
- 直肠(粘膜)脱垂
- 盆腔脏器脱垂(膀胱脱垂)

盆底痉挛综合征

- 用力排便时, 盆底肌肉收缩而不松弛的功能性疾病。
- 男性及年轻便秘患者多见。
- 肛门直肠测压: 常提示排便时肛门括约肌矛盾性收缩。

盆底痉挛综合征

- M/70; 排便费力、不尽感5-6年, 长期依赖药物排便。

耻骨直肠肌综合征

- 耻骨直肠肌挛缩性肥大，提示出口梗阻。
- 肛门直肠测压：静息压及收缩压均增高，括约肌功能长度增加。
- 动态磁共振排便造影检查表现与盆底痉挛综合征类似，但可见到肥大的耻骨直肠肌。

耻骨直肠肌综合征

- F/33; 排便费力伴左下腹胀7年余，便无干结。

会阴下降、直肠突出

- 会阴下降、直肠突出多伴发，部分患者可出现直肠粘膜松弛或脱垂，盆腔脏器脱垂。
- 多见于女性患者，特别是生育后或老年患者。
- 肛门直肠测压：常表现直肠推进不足，肛门括约肌松弛，排便时肛门括约肌松弛不全
- 直肠前突多见，后突少见。

直肠前突

- F/59; 大便干结、排便困难20余年。

会阴下降、直肠前突、膀胱脱垂

- F/46; 排便费力10余年，无大便干结。

直肠(粘膜)脱垂

- 较少见，多伴发于会阴下降等，单发罕见。
- 肛门直肠测压：排便时肛门括约肌松弛不全，考虑与肛门粘膜脱垂有关。
- 肛门直肠指检可有阳性发现。

直肠粘膜脱垂、膀胱下垂

- F/47; 大便干结、排便费力15余年。

盆腔脏器脱垂

- F/52; 大小便等用力后肛门外有物脱出20余年; 大便次数较多, 10余次每日, 无便血; 伴下腹部疼痛; 需要用手回纳; 用力后直肠全层脱出。
- 综合检查术前诊断: 直肠脱垂。
- 行经肛直肠切除乙状结肠肛门吻合术 (Altermeier 术)。直肠脱垂手术后1个月复查, 大便每日2次, 便后肛门外无物脱出。

盆腔脏器脱垂

盆腔脏器脱垂

盆腔脏器脱垂

盆腔脏器脱垂

诊断价值

- 磁共振检查具有极好的软组织对比和多平面成像功能 通过动态磁共振排粪造影所显示的盆底结构、功能异常，对便秘的分型及程度提供客观依据，能用于指导相关科室进一步的治疗。
- 用于治疗后（包括手术治疗）复查，客观评价治疗效果。
- 可发现扫描范围内盆腔内其他组织、结构的异常或病变，观察其与便秘发生的相关性。

Thank you!

泻剂结肠的病理变化与研究进展

浙江省立同德医院
魏红权
2016年5月

- 概述
- 病因、发病机制
- 临床、病理表现
- 诊断难点
- 随访

【概况】

- 欧美多见，西方国家UC的发病率稳定在10/100000，CD的发病率呈上升趋势，目前为1-7/100000。我国少见，近年有发病有上升趋势
- 年轻人多见，发病年龄多在5-30岁。性别无差异
- 终生复发倾向
- 近年IBD的研究报告日渐增多，在病因与发病机制、诊断与治疗等方面均取得了一定进展

【定义】

炎症性肠病 (Inflammatory Bowel Disease, IBD)

- 是一组病因不十分清楚的慢性非特异性肠道炎性疾病
- 包括溃疡性结肠炎 (Ulcerative Colitis, UC) 和克隆病 (Crohn's Disease, CD)。二者在病因、发病机制及临床表现有许多相似之处。

【病因与发病机制】

- 一直是医学界的研究热点
- 迄今未完全明确，多认为是多因素相互作用所致，属肠道免疫炎症性疾病
- 发病机制假设：感染、饮食等因素作用于易感人群，使肠免疫反应过度亢进导致肠粘膜损伤

【病因与发病机制】

一直是医学界的研究热点，迄今未完全明确，多认为是多因素相互作用所致

- (一)、微生物因素
- (二)、环境和遗传因素
- (三)、免疫因素
- (四)、其他因素

(一) 感染因素 infectious factors

- 大肠杆菌
- 病毒可能性最大
- 难辨梭状芽孢杆菌毒素

(二) 遗传因素 hereditary factors

- 种族差异
- 家族多发
- 单卵双胎发病一致性
- HLA-DR2: 患者频率 > 普通人
- HLA-B27基因

(三) 免疫异常 immune disorders

依据

- 伴肠外自体免疫性疾病表现
- 自身抗体、免疫复合物
- 淋巴细胞间接细胞毒作用
- 结肠病变中淋巴、浆、巨核和肥大细胞↑
- 肾上腺皮质激素治疗可缓解

(四) 精神因素 psychogenic factors

属心身性疾病

1. 依据: 精神紧张、劳累可诱发
常有精神抑郁和焦虑表现
2. 机制: 大脑皮层功能障碍→植物神经
3. 意义: 本病的诱因或继发表现

etiopathogenesis

发病机制:

- 遗传易感性 + 环境因素 + 肠道菌群

【临床表现】

- 起病多缓慢。病程呈慢性经过，发作期与缓解期交替
- 可因饮食失调、劳累、精神刺激、感染等诱发发作或加重
- 临床表现与病变范围、病型及病期等有关
- 临床表现: (1) 消化系统表现: 主要包括腹痛、腹泻、脓血便、腹部包块、瘻管形成、肛周病变等;
- (2) 多种肠外表现: 可有关节、皮肤、眼、口及肝胆等肠外表现
- (3) 全身表现: 发热及营养障碍等
- 体征: 腹部压痛、包块、肛周病变、营养不良及并发症的体征
- 并发症: 主要包括中毒性结肠扩张、肠穿孔、肠梗阻、急性大出血、瘻管形成及肛周病变及癌变

病理

pathology

主要与溃疡性结肠炎有关的镜下改变

- ◆ 隐窝结构异常
 - 隐窝分支(crypt branching):
 - 隐窝扭曲(crypt distortion)
 - 隐窝萎缩(crypt atrophy)和隐窝密度减少(crypt density)
 - 绒毛状黏膜 (surface irregularity)
- ◆ 上皮异常的形态改变
 - 潘氏细胞化生、
 - 黏液分泌减少
- ◆ 炎性浸润
 - 局灶性(focal)、
 - 片状(patchy)

- 隐窝结构异常、上皮异常和炎性浸润三部分。这些改变均不是特异性的也可以见于克罗恩病和其他结肠炎。

主要与克罗恩病有关的镜下改变

- 隐窝结构异常
- 溃疡和炎性浸润
- 上皮的异常
- 肠道神经系统的异常

【鉴别诊断】

需与IBD鉴别的疾病

感染性	非感染性
<p>细菌性:沙门氏菌, 志贺氏菌, 空肠弯曲菌, 耶尔森氏菌, 致病性大肠杆菌, 抗菌药物相关性肠炎, 结核, 急性阑尾炎</p> <p>病毒:单纯疱疹性直肠炎, 巨细胞病毒感染</p> <p>原虫性:阿米巴病, 血吸虫病</p>	<p>血管性:缺血性结肠炎, 放射性直肠炎, 血管畸形, 痔疮</p> <p>特发性:白塞病, 胶原性结肠炎</p> <p>药物性:非甾体类抗炎药</p> <p>肿瘤性:结肠癌, 淋巴瘤, 消化道类癌, 白血病, 结肠息肉病</p> <p>其他:憩室炎, 嗜酸性细胞性胃肠炎, 自身免疫病, 麦胶性肠病</p>

UC及CD临床及病理特点

项目	UC	CD
病变分布	结肠	消化道任何部位, 回肠及近端结肠最多
临床特点	<p>脓血便多见</p> <p>症状少见</p> <p>梗阻罕见</p> <p>瘻管形成不太多见</p> <p>肛周病变</p>	<p>腹泻, 脓血便少见</p> <p>常见</p> <p>常见</p> <p>常见</p>
内镜及放射检查	<p>病变连续</p> <p>绝大多数受累</p> <p>少见</p> <p>溃疡浅, 溃疡间粘膜皱襞充血水肿, 颗粒状, 脆性增加</p> <p>常见</p> <p>少见, 中心性</p>	<p>节段性</p> <p>少见</p> <p>多见</p> <p>纵行或匍行溃疡, 溃疡深, 周围粘膜正常或鹅卵石样改变</p> <p>不常见</p> <p>多见, 偏心性</p>
病理改变	<p>病变主要在粘膜层, 有浅溃疡、隐窝脓肿、杯状细胞减少等</p>	<p>节段性全壁炎, 有裂隙状溃疡、非干酪性肉芽肿等</p>

肠结核和回结肠型克罗恩病的临床和病理鉴别诊断

项目	肠结核	回结肠型克罗恩病
胸片	阳性	阴性
T-spot	阳性	阴性
影像学检查	肠系膜淋巴结肿大伴坏死	肠系膜淋巴结肿大无坏死
内镜见回盲部病变	短	长
大便培养阳性率	30%	阴性
透肠肉眼观	呈椭圆形或者环形, 与肠管的长轴垂直	呈线状, 深在, 纵行, 与肠管的长轴平行
瘻管形成	一般无	多见
肠管狭窄段	小于3cm	大于3cm
肉芽肿	干酪肉芽肿大、多、融合,	黏膜内非干酪肉芽肿小、少、分散
透壁性淋巴滤泡增生	无	常见
抗酸染色	阳性	阴性
结核杆菌DNA-PCR检测	阳性	阴性
肛管病变	少见	常见

【IBD的诊断】

IBD无特异性诊断指标, 目前尚无理想的实验指标能替代临床常用的综合因素评估方法需排除各种可引起类似肠道炎症的病因后才能做出诊断

完整的诊断应包括临床类型、严重程度、病变范围、病情分期及并发症

- 可靠的诊断应建立在结合病史临床评估, 实验室检查, 以及典型的内镜、组织学和影像学发现的基础上, 需要临床胃肠病学家、影像学家、病理学家等的团队合作

1. 血液: 贫血、WBC↑、ES C反应蛋白↑

2. 粪便: 粘液脓血, 镜检红、病原体全阴性 (排除感染)

3. 自身抗体检测

4. 结肠镜检查

5. 钡灌肠:

急性期 (早期) — 皱襞粗大紊乱
活动期 (溃疡) — 锯齿状边缘
缓解期 (后期) — 结肠袋消失、肠壁僵硬假息肉或圆形充盈缺损。

Marker	UC (n=100)	CD (n=100)	Sensitivity (%)	Specificity (%)	PPV (%)	NPV (%)
p-ANCA	100	10	100	90	100	90
ASCA	10	100	10	100	10	100
p-ANCA/ASCA	100	10	100	90	100	90
ASCA/p-ANCA	10	100	10	100	10	100
Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)	10	100	10	100	10	100
Anti-Oligosaccharide (A/O)	10	100	10	100	10	100
Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)	10	100	10	100	10	100

(Shanahan P. Gastroenterology 2001;120:622)

特异性抗体 特异性

UD p-ANCA 14% - 98% (抗中性粒细胞胞浆抗体)

CD ASCA 56% - 92% (抗酿酒酵母抗体)

- **到目前为止,尚未有用于内镜活检标本的鉴别克罗恩病和溃疡性结肠炎的组织学特点的金标准。**
- **胃肠**病理学家对于二者的区别尚未达到高度的一致。
国外专业胃肠病理学家对于初次诊断克罗恩病的一致性为**64%**,而溃疡性结肠炎为**74%**。

- **多部位黏膜活检**取材十分重要。推荐做至少**5**个部位(包括直肠和末段回肠在内,每个部位取不少于**2**个活检。内镜下**未见异常**的黏膜也应取活检。

- 样本的**定向使用滤纸**效果较好,即黏膜断面的一侧在固定前黏在滤纸上。**不同部位**的活检组织应当用不同的容器并且注明**患者的信息和取材部位**以避免混淆。

- 与活检样本一起送病理科的病理申请单一定要有患者的临床信息,包括患者的**年龄、性别、患病程期、内镜发现、治疗的种类和程期、并发症、旅行史和临床诊断等。**

- 由于炎症性肠病的病变可能为局灶性在组织包埋时,建议每个蜡块最多包埋**2**块组织。推荐对每个蜡块均做标本**最大面**的多个**连续切片**(6~10片)并且采取措施确保切片方向**垂直**于黏膜。

癌变的监测

结直肠癌变 carcinogenesis

溃疡性结肠炎相关性结直肠癌的研究进展
Risks factors and mechanisms of carcinogenesis of ulcerative colitis-associated colorectal cancer

- **UC: 病程8-10年以上,病程30-40年以上的患者,更应密切随访。**
- **CD: 发病年龄轻、病程长和累及范围广(全结肠炎),需长期随访。**

CD患者发生小肠腺癌的风险是非CD患者的**10-30倍**。
小肠腺癌典型地出现在CD诊断**5**年后患者的回肠病变中,
常与之前或者同时期的回肠**炎症病变**相关。

感谢您的聆听

慢传输型便秘的中西医结合治疗进展

浙江省立同德医院
结直肠肛门疾病诊治中心

陈诚豪

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
Bring You Health and Happiness

便秘的流行病学资料

- 我国成人慢性便秘患病率为4%~6%
- 随年龄增长而升高,
- 60岁以上人群慢性便秘患病率可高达2%。
- 女性患病率高于男性,
- 男女患病率之比为1: 1.22 ~ 1:4. 56。

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
Bring You Health and Happiness

便秘de危害: 马季、胡耀邦等名人为例

- 引起危及生命的疾病发作
 - 诱发高血压、冠心病。
 - 诱发脑出血、心肌梗死。
 - 引起猝死。
 - 长期便秘可导致结肠癌、直肠癌、乳腺癌等。
- 引发慢性疾病
 - 肛裂、肛瘘。
 - 痔疮、脱肛、肠梗阻
 - 子宫脱垂、盆腔脏器炎症。
- 导致生活质量下降,便秘可通过许多继发病影响病人生活质量
 - 全身皮肤:痤疮、粉刺、皮肤瘙痒。
 - 面部:色素沉着、皮疹
 - 饮食无味、口臭、体味
 - 腹胀、梨形身材、胖肚子
 - 神经衰弱、失眠、烦躁易怒等精神症状。
 - 性欲下降、性生活障碍

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
Bring You Health and Happiness

中国慢性便秘的诊治指南 2003 南昌-2007扬州-2013武汉

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组、中华医学会全科医学分会消化内科学组

共识与指南

中国慢性便秘的诊治指南(2007,扬州)

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组、中华医学会全科医学分会消化内科学组

2003年9月南昌全国胃肠病学专题研讨会制定了我国“慢性便秘的诊治指南”(以下简称“指南”)。“指南”对慢性便秘性便秘的诊断和治疗起到了积极的作用。随着对慢性便秘认识的不断深入,2007年南昌胃肠病学和胃肠动力学组进行了修订,有必要对“指南”作相应修订。

慢性便秘(chronic constipation)是指排便次数减少,粪便量减少,粪块干结,排便费力,排便不畅(chronic constipation)持续至少6个月。

临床特征
排便次数减少
排便费力
排便时腹痛
排便不尽感
排便阻塞感

• 便秘(定义)
• 排便次数减少,粪便干硬和(或)排便困难,排便次数减少至每周排便少于3次。
• 排便困难包括排便费力、排出困难、排便不尽感、排便费时以及需手法辅助排便。
• 时间:慢性便秘病程至少为3个月。

2013 武汉

中国便秘指南

功能性便秘分型变化

2007	2013
<ul style="list-style-type: none"> • 慢传输型便秘 • 出口梗阻型便秘 • 混合型便秘 	<ul style="list-style-type: none"> • 慢传输型便秘 • 排便障碍型便秘: <ol style="list-style-type: none"> 1.不协调性排便 2.直肠推进力不足 • 混合型 • 正常传输型便秘

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
GASTROENTEROLOGY 2013;144:211-217
Bring You Health and Happiness

发病机制

功能性便秘

- 慢传输型
- 排便障碍型
- 混合型

多见于IBS-C,发病与精神心理异常等有关

- 肠神经元和神经递质异常
- Cajal间质细胞和肠神经胶质细胞减少有关
- 亦与结肠粘膜离子通道功能障碍
- 腹肌、直肠、肛门括约肌和盆底肌肉不能有效地协调运动,
- 直肠推进力不足,感觉功能下降

器质性便秘

肠道疾病(结肠肿瘤、憩室、肠腔狭窄或梗阻、巨结肠、结直肠术后);
内分泌和代谢性疾病(严重脱水、糖尿病、甲状腺功能减退或亢进);
神经系统疾病
肌肉疾病(淀粉样变性、肌膜炎、硬皮病、系统性硬化病)

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
Bring You Health and Happiness

便秘病因

Simple constipation	
Dietary:	Inadequate fibre
Lifestyle:	Repressed defecatory urge
Secondary constipation	
Congenital:	Hirschsprung's disease, idiopathic megacolon/megacolon
Mechanical:	Carcinoma
Drugs:	E.g., analgesics, antidepressants
Metabolic:	E.g., diabetic neuropathy, chronic renal failure
Endocrine:	E.g., hypothyroidism, hypercalcaemia
Neurological:	Multiple sclerosis, spinal trauma, autonomic neuropathy
Parkinson's disease	
Psychological:	E.g., depression, anorexia
Idiopathic slow transit constipation	
Defecation disorder	
Functional:	Anismus, ineffective straining, solitary rectal ulcer syndrome
Structural:	Rectocele, ascending peritonum
Constipation predominant irritable bowel syndrome	

便秘应该尽早正确治疗!

- 长期便秘患者容易产生情感心理障碍, 进一步加重患者的便秘症状, 形成“情感障碍-便秘-情感障碍”的恶性循环。
- 功能性便秘病程 >1 年, 焦虑症状的发生率为29%; 病程 >1 年, 发生率为44.7%
- 而且随着就医保守治疗的时间越来越严重。发展成顽固性便秘: **便秘应该尽早正确治疗!**

便秘的辅助检查项目

- 结肠传输试验
- X线排粪造影
- 钡灌肠
- 肛管直肠测压
- 球囊逼出试验
- 盆底肌电图
- 肛管腔内超声
- 电子肠镜
- 盆底四重造影
- MRI排粪造影

手术治疗

- 真正需要外科手术的慢性便秘患者尚属少数
- 症状严重影响工作和生活, 且经过一段时间正规的非手术治疗无效时, 可考虑手术治疗, 一定要掌握好手术适应证

手术名称	疗效	特点	备注
全结肠切除+回肠直肠吻合术	63-100%	手术切除范围较大, 手术治疗后的远期疗效不理想, 而且存在较多的术后并发症, 常见的并发症有顽固性腹泻和肠梗阻。	术前应进行上消化道生理功能测试, 如果上消化道发现异常, 在接受该手术前, 应该告知患者手术疗效不确定。
次全切除+回肠乙状结肠吻合	50%的复发率	术后的临床效果和生活质量改善情况并不乐观	临床使用较少
次全切除+盲肠直肠吻合	有效率68.8-98%	保留回盲瓣和盲肠部分, 不但能够通过控制食糜进入结肠的速度而控制新粪便的形成, 而且能够维持水分和维生素的正常吸收功能, 降低了腹泻的发生率。	对于年纪较轻的患者, 小肠传输功能未减退, 可以考虑
腹腔镜结肠切除术	术后3个月症状改善率74%以上, 术后12个月80%以上	创伤小、术后恢复速度快和患者住院时间短, 更容易被患者接受, 长期治疗效果还有待于进一步观察。	主要技术难题是肝曲和脾曲的游离, 便秘患者往往结肠冗长扭曲和脾曲位置抬高, 增加了腹腔镜手术的难度。
结直肠全切除后行回肠直肠肛管吻合	二次手术率高达10%	切除范围大、创伤大、手术操作复杂, 而且有文献报道患者在手术后可能会出现排便障碍、输尿管炎和吻合口漏等并发症。	其临床应用受到较大限制
回肠造口袋成形	李岗报道术后排便控制能力满意, 患者满意度高		患者满意度高

手术名称	疗效	特点	备注
结肠部分切除术	国外报道有效率68, 国内报道有效率33%-46%	创伤小、恢复快、远期腹泻发生率低的, 但因为难以判断功能异常肠段, 术后便秘复发率高	关键并非技术本身, 而在于术前是否对引起便秘的异常肠段位置做出准确判断。把结肠传输试验的未次切片(通常每2-3cm)以及结肠传输试验结果, 均体现了医生对术前精准判断病变肠段部位的重要性。
结肠旷置手术	93.94%	操作简单、对患者创伤小(因此患者术后恢复速度较快)、术后并发症低, 旷置的结肠为盲祥, 导致腹痛等临床表现, 增加了闭合回路带来的不可控制的风险, 大大降低了患者术后生活质量	适用于老年体弱、不能耐受大手术者。
回肠造口手术		功能毁损大、患者术后生活质量差, 难以被患者接受, 仅在其他手术出现吻合口漏等并发症, 或效果不佳、证实有全小肠传输迟缓时采用。	应用于老年体弱的便秘者时, 能够明显提高患者的生活质量。可以作为结肠切除术前的一种预先测试, 如果患者有高的回肠造口输出量或者经常伴随便秘的疼痛和腹胀不能解决, 那么结肠切除术不被推荐。
回肠或阑尾造口顺行灌	61%	在儿童被成功的应用, 但在成人中应用较少	对于那些结肠运动功能丧失并且需要结肠灌洗的患者, 进行顺行结肠灌洗可能是一个有效的选择。

腹腔镜手术与开腹手术治疗慢传输型便秘临床效果的 Meta 分析

郭震 陈辉 刘韦成 钱群

【摘要】目的 系统评价腹腔镜手术以及开腹手术治疗慢传输型便秘的临床效果。**方法** 全面检索 PubMed, corehrane library, EMBASE database, OVID LWW database, ACP Journal Club, 康健临床决策循证数据库 Foreign Evidence-Based Medicine, FEEM, 中国医学文献数据库(CBM), 万方数据库, 维普数据库以及中国知网数据库。检索时限均为建库至 2012 年 7 月。收集腹腔镜手术与开腹手术治疗慢传输型便秘的比较研究的英文文献以及中文文献, 通过至少两名研究者的独立筛选获得最终的纳入研究文献, 利用 RevMan5.1 软件对两种方法的治疗效果进行 Meta 分析。**结果** 最终纳入 8 篇, 其中 5 篇随机对照研究, 2 篇回顾性研究, 1 篇临床对照研究。与开腹手术相比, 腹腔镜手术术后粘连性肠梗阻发生率 RR = 0.20, 95% CI: 0.06 ~ 0.67, P = 0.009) 以及术后切口并发症发生率 RR = 0.21, 95% CI: 0.07 ~ 0.63, P = 0.005) 降低, 术中出血量(WMD = -95.96, 95% CI: -134.02 ~ -57.90, P < 0.00001) 减少, 住院时间(d) (WMD = -4.02, 95% CI: -6.33 ~ -1.72, P = 0.0006) 以及术后肠道功能恢复时间(d) (WMD = -1.19, 95% CI: -2.09 ~ -0.29, P = 0.010) 缩短, 但手术时间(WMD = 24.42, 95% CI: 3.21 ~ 45.63, P = 0.02) 增加。两种方法的术后进食或排便时间与排便次数的差异无统计学意义。**结论** 腹腔镜手术治疗慢传输型便秘能够达到开腹手术的安全性和疗效, 同时能够显著降低开腹手术的手术并发症。

【关键词】 慢传输型便秘; 腹腔镜手术; 开腹手术; 系统评价; Meta 分析

单孔腹腔镜回肠直结肠吻合术:

FIGURE 2. The terminal ileum was transected by a stapler after laparoscopic mobilization of the ileocecal junction and ileoproctostomy was performed using a circular stapler inserted transanally after extracorporeal placement of an avial on the stump of the ileum.

FIGURE 3. The single surgical wound placed longitudinally across the umbilicus.

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

Bring You Health and Happiness

回肠远段环形贮袋的临床应用

李茵, 游柳平, 李胜龙, 刘家猷, 黄跃南

作者单位: 150086 哈尔滨医科大学附属第二医院普外科
通信作者: 黄跃南, E-mail: ghu@123888@163.com

【摘要】目的 总结回肠远段环形贮袋的临床应用经验。**方法** 回顾性分析 9 例慢传输型便秘, 7 例家族性腺瘤性息肉病和 3 例慢性结肠炎手术治疗的临床资料。19 例患者均行全结肠切除、回肠远段环形贮袋一直肠吻合术。观察术后疗效及并发症发生情况。**结果** 19 例均手术成功, 术后肛门排气时间平均 3.5 d, 3 ~ 6 d 排便。术后随访 6 个月 ~ 2 年, 无顽固性腹泻、吻合口漏、肠梗阻等并发症, 疗效满意。**结论** 全结肠切除、回肠远段环形贮袋一直肠吻合术是治疗慢传输型便秘、家族性腺瘤性息肉病和慢性结肠炎的有效措施, 术后排便控制能力满意, 是一种较为理想的术式。

全结肠旷置加回直逆蠕动侧侧吻合术治疗高龄慢传输型便秘

丁召 陈钰 江从庆 吴云华 郑科炎 秦前波 钱群

- 丁召等对 13 例高龄结肠慢传输型便秘患者行全结肠旷置加回直逆蠕动侧侧吻合术, 发现术后 6 个月 Wexner 便秘评分显著降低, 胃肠道生活质量指数显著提高, 术后 2 个月患者每日排便 3-4 次, 无便秘复发或腹泻。

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

Bring You Health and Happiness

回肠或阑尾造口顺行灌洗术

- Emilie Duchalais 等评价了经皮内镜下盲肠穿孔(PEC)插管行顺行结肠灌洗(ACE)治疗重度便秘 1 年后的疗效, 因为慢性疼痛拔除插管的有 5 例 (26%), 有 1 例患者因为不相关原因死亡, 有 61% 的患者一直使用 ACE, 14% 的患者暂停使用泻药和逆行灌肠, 便秘和生活评分改善的有 15 例, 中位 KESS 评分从 PEC 前的 25 改善为 1 年后的 17, 中位 GIQL 评分从 69 提高到 95。

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

Bring You Health and Happiness

药物

- 泻剂
- 促动力药: 普芦卡必利
- 促分泌药: 包括鲁比前列酮、利那洛肽
- 灌肠药和栓剂
- 益生菌

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

Bring You Health and Happiness

治疗便秘常用的药物		证据等级和推荐水平
容积性泻剂	欧车前	I 级, B 级
	聚卡波非钙	III 级, C 级
	麦麸	III 级, C 级
	甲基纤维素	III 级, C 级
渗透性泻剂	聚乙二醇	I 级, A 级
	乳果糖	II 级, B 级
软化剂	磺基丁二酸钠二辛酯	III 级, C 级
刺激性泻剂	比沙可啶/匹可硫酸钠	II 级, B 级*
	番泻叶	III 级, C 级
其他	普芦卡必利	I 级, A 级*
	鲁比前列酮	I 级, A 级*

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

World Gastroenterology Organisation, 2010;11

西药最新药物

名称	特定患者	作用机制	推荐剂量	常见副作用
普鲁卡必利	女性便秘患者	5-HT4受体激动剂，只针对结肠，对胃排空和小肠传输无任何影响	2mg, qd	治疗初期出现头疼、腹痛、腹泻、恶心等不适
利那洛肽	成人慢性特发性便秘和便秘型肠易激综合征 (IBS-C)	鸟苷酸环化酶C(GC-C)激动剂	145ug	腹泻
鲁比前列酮	成人慢性非癌性疼痛的阿片类药物导致的便秘。	激活2型氯离子通道 (ClC-2)，增加肠液的分泌和肠道的运动，从而增加排便。	24ug, bid	恶心，腹泻
爱维莫潘	术后肠梗阻患者	选择性的阿片受体抑制剂	术前1粒，此后1#bid，持续7天，总用药不超过15次。	低血钙、贫血和胃肠道症状

- **鲁比前列酮**
 - 选择性地激活肠上皮细胞顶膜的2型氯离子通道 (ClC-2)，促进肠上皮细胞氯离子分泌而增加肠液分泌并增强肠道活动性
 - 不改变血浆中药物浓度的

- **普鲁卡必利**
 - 是一种高选择性的5-HT4受体激动剂，使肠蠕动
 - 随时间增加，排便频率增加，直肠扩张和
 - 电刺激的敏感性增加

- **利那洛肽 (Linaclotide)**
 - 是一种非亲核碱基的鸟苷
 - 酸酶C在结肠黏膜层的鸟苷酸环化酶C受体激动剂，促进氯化物的分泌
 - 目前已被美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准用于治疗成人慢性特发性便秘和便秘型IBS

浙江省肿瘤医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
Bring You Health and Happiness

结论:

- 便秘不再是过去的便少、便干、便难的单纯概念，单纯的只要对症治疗的便秘。需要个体化的、内外科联合的治疗。
- 痔疮也不是以前想象的单纯的只是分析治疗痔疮。痔与便秘伴发常见，互为因果，需要同等待、一起治疗。
- 详细了解病史、全面系统检查、及科学而实用的诊断分型是制定有效方案提高疗效不可缺少的三大步骤。
- 精神因素是诊治便秘不可忽视的重要环节。
- “外科便秘”需要**及时手术治疗**，但是需要在正确诊断、分型，并且主刀临床外科经验丰富、病人意愿强烈积极配合的基础上。
- 非常赞同成肛肠向东教授团队的便秘分度分期论治。
- 对于非外科手术需要的便秘，中医治疗应该是一个较好的选择。
- 除了手术和药物，生物反馈治疗在便秘治疗中具有重要作用。
- 盆底外科、多学科协作是今后阐明出口梗阻型便秘、明显提高疗效的方向。

出口梗阻型便秘诊断新进展

浙江省立同德医院结直肠肛门疾病诊治中心

蔡珂

2016.05. 杭州

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
肛肠中心 Bring You Health and Happiness

中国慢性便秘的诊治指南

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会全科医学分会便秘学组

共识与指南

中国慢性便秘诊治指南(2013, 杭州)

中国慢性便秘诊治指南(2013, 武汉)

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会全科医学分会便秘学组

2003年首次制定便秘专题研讨会制定了我国“慢性便秘的诊治指南”，对规范临床诊断和治疗起到了积极作用。随着罗马IV标准的发布，2007年该指南在临床实践中进行了修订。近年随着临床研究的不断深入，对慢性便秘的认识水平进一步提高，有必要对该指南进行修订。

2016年中华医学会消化病学分会胃肠动力学组、中华医学会全科医学分会便秘学组联合修订了我国“慢性便秘的诊治指南(以下简称“指南”)”，“新版”指南旨在进一步规范慢性便秘的临床诊断和治疗，为临床医生提供参考。2016年新版指南与2007年版指南的主要修订如下：“新版”指南修订：

① 慢性便秘(Chronic constipation)定义为排便次数减少、粪便干硬(罗马IV)或排便费力，排便次数减少至少少于3次/周，排便费力或排便不尽感至少持续3个月。

② 慢性便秘的诊断标准：排便次数减少至少少于3次/周，排便费力或排便不尽感至少持续3个月。

③ 慢性便秘的病因：慢性便秘可由多种因素引起，包括功能性便秘和器质性便秘。不少病例亦可同时存在(见表1)。在慢性便秘的病因中，大部分为功能性便秘，包括肠动力性便秘(chronic idiopathic constipation)、肠传输障碍型便秘(transit defecation disorder)、排便节律障碍综合征(irregular bowel syndrome with constipation)、IBS-C。

④ 慢性便秘的治疗：慢性便秘的治疗应首先考虑非药物治疗，包括生活方式调整、膳食纤维补充、渗透性泻剂、容积性泻剂、刺激性泻剂、促动力药等。对于难治性慢性便秘，可考虑生物反馈治疗、经肛电刺激等。对于伴有焦虑、抑郁等心理问题的患者，应给予心理治疗。

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会全科医学分会便秘学组

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
肛肠中心 Bring You Health and Happiness

中国便秘指南

功能性便秘分型变化

2007

- 慢传输型便秘
- 出口梗阻型便秘
- 混合型便秘

2013

- 慢传输型便秘
- 排便障碍型便秘：
 1. 不协调性排便
 2. 直肠推进力不足
- 混合型
- 正常传输型便秘

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会全科医学分会便秘学组

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
肛肠中心 Bring You Health and Happiness

功能性便秘的诊断

- ① 排除器质性疾病和药物因素导致的便秘
- ② 符合罗马III标准中功能性便秘的诊断标准
- ③ IBS-C亦属于功能性疾病引起的便秘，其诊断需符合IBS的诊断标准和分型标准。

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
肛肠中心 Bring You Health and Happiness

罗马III标准中功能性便秘的诊断标准

疾病名称	诊断标准
功能性便秘	1. 必须包括下列2项或2项以上：①至少25%的排便感到费力；②至少25%的排便为干球粪或硬粪；③至少25%的排便有不舒适感；④至少25%的排便有肛门直肠梗阻感和(或)排便感；⑤至少25%的排便需手法辅助(如用手指协助排便、置入支轴)；⑥每周排便少于3次 2. 不用泻剂时很少出现排便 3. 不满足IBS的诊断标准 * 诊断前症状出现至少6个月，且近3个月症状符合以上诊断标准
功能性排便障碍	1. 必须符合功能性便秘的诊断标准 2. 在反复尝试排便过程中，至少包括以下3项中的2项：①球囊逼出试验或影像学检查证实排出功能减弱；②压力测定、影像学或电刺激证实盆底肌肉(如肛门括约肌或耻骨直肠肌)不协调收缩或括约肌基础静息收缩率<20%；③压力测定或影像学证实排便时直肠推进力不足 * 诊断前症状出现至少6个月，且近3个月症状符合以上诊断标准

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会全科医学分会便秘学组

浙江省立同德医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE
肛肠中心 Bring You Health and Happiness

出口梗阻性便秘检查方法与价值意义

TONGDE HOSPITAL

同德

同德医院

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

辅助检查

- 结肠传输试验
- X线排粪造影
- 钡灌肠
- 球囊逼出试验
- 盆底肌电图
- 肛管腔内超声
- 电子肠镜

辅助检查

dynamic MRI (MRI排粪造影)

肛直角变化正常 MRI下显示

Fig. 6. Normal variations of the Anorectal Angle (ARA): ARA at rest, during squeezing and straining at dynamic MRI, correlation with pubo-rectal muscle's activity.

1.RHeinrich H, Sauter M, Fox M, et al Assessment of Obstructive Defecation by High-Resolution Anorectal Manometry Compared With Magnetic Resonance Defecography. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1310-1317.

辅助检查

dynamic MRI (MRI排粪造影)

肛直角变化异常 MRI下显示

Rest Squeezing Straining

1.RHeinrich H, Sauter M, Fox M, et al Assessment of Obstructive Defecation by High-Resolution Anorectal Manometry Compared With Magnetic Resonance Defecography. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1310-1317.

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2015;13(10):1317

Assessment of Obstructive Defecation by High-Resolution Anorectal Manometry Compared With Magnetic Resonance Defecography

高分辨直肠测压与动态MRI在便秘评估方面的比较

Henriette Heinrich,^{1,2,3} Matthias Sauter,^{1,2,3} Mark Fox,^{1,2,3} Dominik Wenzhaupt,^{1,2,3} Marcel Halama,^{1,2,3} Benjamin Misselwitz,^{1,2,3} Simon Buehtiker,^{1,2,3} Gaëlle Reiner,^{1,2,3} Michael Fried,^{1,2,3} Werner Schwizer,^{1,2,3,4} and Heiko Fruehauf^{1,2,3}

BACKGROUND & AIMS: Patients with obstructive defecation have abnormalities of anorectal function and/or structure. Conventional anorectal manometry (ARM) can identify abnormal function and behavior (dyssynergia); however, agreement between manometry and defecography is only fair. High-resolution (HR)-ARM may improve diagnostic agreement by differentiating pressure effects caused by dyssynergia and obstruction. We compared HR-ARM findings with magnetic resonance (MR) defecography in the clinical assessment of patients with symptoms of obstructive defecation defined by Rome III criteria.

METHODS: HR-ARM (Natuson All 340; Cien Imaging, Ypsen, Israel) assessed anal sphincter function and pressure during simulated defecation. Internal manometric findings were classified according to the Rao system and compared with MR defecography as the reference standard.

RESULTS: A total of 188 consecutive patients (155 women; age, 19-93 y) with obstructive defecation underwent a full investigation. Compared with patients with dyssynergia on MR imaging (n = 66), patients with structural pathology (n = 87) had lower resting ($P < .003$) and squeeze pressures ($P < .011$), but a higher rectoanal pressure gradient ($P < .0001$) on HR-ARM. High intrarectal pressure with a steep, positive pressure gradient consistent with outlet obstruction on HR-ARM was present in 24 patients with intra-anal intussusception on MR imaging. This pattern was not observed in other patients. Interobserver agreement was substantial for HR-ARM diagnoses ($\kappa = 0.67$; 95% confidence interval, 0.559-0.779). Diagnostic accuracy for dyssynergia was 82% compared with MR imaging (sensitivity, 77% [51 of 66]; specificity, 85% [104 of 122]).

本研究共有188名有完整评估的便秘患者，与MRI上显示排便协同失调的66例患者相比，87例盆底结构异常的患者有着更低的静息压和收缩压，但在R-ARM上有着更高的直肠肛管压力梯度。

辅助检查

Anorectal manometry and HR-ARM (直肠测压)

1.RHeinrich H, Sauter M, Fox M, et al Assessment of Obstructive Defecation by High-Resolution Anorectal Manometry Compared With Magnetic Resonance Defecography. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1310-1317.

直肠指诊---非常重要!!!

- 1 外观: 有无松弛、脱垂
- 2 指诊
排除占位病变、
耻骨直肠肌综合征
- 3 做提肛、排便动作

出口梗阻性便秘-诊断

诊断标准

- 会阴下降的诊断标准是肛上距力排时 $\geq 31\text{mm}$ ，经产妇 $\geq 36\text{mm}$ 为会阴下降，会阴下降多同时伴有直肠粘膜脱垂及直肠前突(图1, A)；
- 第三骶椎水平处骶骨和直肠之间的距离 $>20\text{mm}$ ，且直肠近端向前下移位，乙状结肠或小肠位于骶直间，可确诊骶直分离(图1, B)；
- 盆底痉挛综合征患者，在力排状态下肛直角不增大，保持 90° 左右甚至更小，通过测量静息相、提肛相、力排相肛直角大小，观察肛直角后缘半弧形的耻骨直肠肌痉挛迹深度的变化来确诊盆底痉挛综合征(图1, C)；
- 直肠前突主要测量深度力排时直肠向前突出最点到虚拟的正常直肠壁位置的直线长度(图1, D)。

出口梗阻性便秘-治疗

治疗

- 根据可能的病理生理机制选择恰当的治疗方案是提高治疗效果的前提
- 重视询问病史和物理学检查，结合影像学及其他检查手段，分析相关原因和部位特点，作出个性化的诊断，制定个体化、综合化的治疗，手术前后应配合积极的非手术治疗巩固治疗效果。

中国便秘指南

治疗方法更细化、更多样、更全面

2007

- 一般处理
- 膳食纤维和膳食纤维剂
- 通便药
- 促动力剂
- 中药
- 生物反馈治疗
- 手术治疗

2013

- 调整生活方式
- 药物治疗：泻剂、促动力药、促分泌药、灌肠药和栓剂
- 精神心理治疗
- 生物反馈治疗
- 其他：益生菌、中药、针灸、按摩推拿、经神经刺激治疗
- 手术治疗
- 补充特殊人群的用药

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

精神心理治疗

- 心理指导、认知治疗
- 合并有明显心理障碍的患者可予以抗抑郁焦虑药物治疗
- 严重精神心理异常的患者应转至精神心理科行相关对症治疗

- 59%难治性便秘患者合并精神心理障碍
- 精神心理障碍影响综合治疗效果

许燕, 等. 基础医学与临床 2008; 28: 307

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

Biofeedback using a mirror

Objective Measures

Rectal assessment

- Rectal tone
- Rectal strength and coordination
- Relaxed state
- What happens with lengthening
- Monitor abdomen at same time
- Patient feedback as to what is happening, quality of contraction

Home Exercise Program:

- Tighten, relax, lengthen repeated 10x in a row for learning, development of coordination
- Tighten, relax, lengthen repeated 10x in a row for learning, development of coordination
- 2-3x per day
- Using mirror laying down, when balling
- Can also squat over mirror (easier than hooklying)

If patient has difficulty holding a mirror – educate caregiver on what to look for

Anorectal Angle Relaxation

CONTRACTION TO AVOID DEFECTION

Contracted muscle

DEFECTION

Relaxed muscle

Biofeedback vs Laxatives

Chiarioni 2006 – compared 109 patients with pelvic floor dysynergia

- 5 weekly biofeedback sessions vs polyethylene glycol and 5 weekly counseling sessions to prevent constipation
- **80% improved with biofeedback and 22% with laxatives**
- Biofeedback results sustained at 12 and 24 months – less straining, less incomplete emptying
- Both groups showed increase frequency of voiding

Message: BFB helps with muscle retraining and voiding mechanics -> lasting results

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

肉毒素注射治疗

➢ 肉毒素：向耻骨直肠肌注射肉毒素已成功治疗了盆底功能障碍患者。一项非盲试验报道，在超声引导下向耻骨直肠肌两侧注射80-100U的A型肉毒素有效治疗了排便功能障碍患者[1]。可能需要重复注射来维持获益。

1. Maria G, Cadeddu F, Brandara F, et al. Experience with type A botulinum toxin for treatment of outlet-type constipation. Am J Gastroenterol 2006; 101:2570.

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

Experience with Type A Botulinum Toxin for Treatment of Outlet-Type Constipation.

Source: American Journal of Gastroenterology. 101(11):2570-2575, November 2006.

OBJECTIVES:

Twenty-four consecutive patients with chronic outlet obstruction constipation resulting from puborectalis syndrome were included in the study. The patients were treated with 60 units of type A botulinum toxin, injected into two sites on either side of the puborectalis muscle under ultrasonographic guidance.

RESULTS: At 2 months, evaluation (inspection) revealed a symptomatic improvement in 19 patients. Anorectal manometry demonstrated increased tone during straining from 98 +/- 24 to 260 +/- 20 mmHg at a 1-month evaluation (p<0.01) and 158 +/- 25 mmHg at a 2-month follow-up (p<0.001). Pressure during straining was lower than resting anal pressure at the same time in all patients. Defecography after the treatment showed improvement in anorectal angle during straining, which increased from 98 +/- 9 (degrees) to 123 +/- 15 (degrees) (p<0.001).

CONCLUSIONS: Botulinum toxin injections should be considered as a simple therapeutic approach in patients with obstructed defecation. The treatment is safe and effective, especially with the use of the ultrasonographic guidance that accounts for a more precise injection and consequently better long-term results. Otherwise, given the limited effect of the toxin, repeated injections may be necessary to maintain the clinical improvement.

注射肉毒素可以被认为一项治疗便秘的方法。此方法安全有效，尤其是在超声引导下更有效注射肉毒素以及更好的远期疗效。但由于其的局限性，可能需要重复注射来维持获益。

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

手术治疗

➢ 症状严重影响工作和生活，且经过一段时间正规的非手术治疗无效时，可考虑手术治疗，一定要掌握好手术适应证

➢ 术前因经过详细的相关检查（如影像等），全面了解肠道和肛门直肠功能以及形态学异常的严重程度，制定个体化、综合化治疗方案，实时评估病情变化。

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

World Journal of Gastroenterology

Choosing the right treatment

There exists a great variety of operative techniques to treat patients with ODS. According to the surgeon's preference the approach can be transanal, transvaginal, transperineal or transabdominal.

All techniques have its advantages and disadvantages; thus, we believe that satisfying functional outcomes can only be achieved by offering a tailored approach to each individual patient. Consequently, it is essential for pelvic floor surgeons to focus on more than one operative technique to optimize treatment for defecatory disorders.

The transabdominal laparoscopic VMR showed good functional results for treating ODS in patients with complex rectocele and might also be the preferred technique in patients with preexisting weak sphincter muscle. However, long term results are still lacking.

The transvaginal approach can be offered to patients with an isolated rectocele and the need for additional gynecological operations. Notably, the functional outcome is conflicting and postoperative dyspareunia can occur.

Transanal correction of rectocele is commonly performed, with improved symptoms as demonstrated by several studies. Notably, postoperative fecal incontinence has been reported, especially after the STARR procedure.

Surgery for obstructed defecation syndrome-is there an ideal technique

便秘的外科治疗是不是理想技术?

Core tip: Surgical treatment of obstructive defecation syndrome remains a challenging topic. Several approaches have been described, with controversial functional outcomes. Each technique has its risks and benefits, thus careful patient selection is crucial to achieve optimal functional results. It is mandatory to assess not only defecation disorders but also evaluate overall pelvic floor symptoms, such as fecal incontinence and urinary disorders for choosing an appropriate and tailored strategy. Radiological investigation is essential but may not explain complaints of every patient.

Most important, conservative management should be offered to every patient before planning surgical treatment.

便秘的外科治疗要选择正确的治疗方式, 有经肛的经阴道、经会阴、腹腔镜等, 所有的方法都有其优缺点和缺点, 最重要的是所有计划外科治疗的患者均需谨慎治疗为先。

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

手术治疗

- 术式报道很多, 但没有任何一种手术方式可以称为金标准
- PPH, TST, STARR
- 腹腔镜直肠悬吊固定手术
- “金陵手术”
- 经阴道后盆人工韧带悬吊术
-

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

Surgery for obstructed defecation syndrome-is there an ideal technique

Abstract

Obstructive defecation syndrome (ODS) is a common disorder with a multifactorial etiology. Surgery for ODS usually aims to improve defecation by relieving the obstruction. Several operative techniques to treat patients with ODS, according to the surgeon's preference, have been described: transanal, transvaginal, transperineal, and transabdominal. All techniques have its advantages and disadvantages, but no one method is superior to others. Consequently, it is essential for pelvic floor surgeons to focus on more than one operative technique to optimize treatment for defecatory disorders. The transabdominal laparoscopic VMR showed good functional results for treating ODS in patients with complex rectocele and might also be the preferred technique in patients with preexisting weak sphincter muscle. However, long term results are still lacking. The transvaginal approach can be offered to patients with an isolated rectocele and the need for additional gynecological operations. Notably, the functional outcome is conflicting and postoperative dyspareunia can occur. Transanal correction of rectocele is commonly performed, with improved symptoms as demonstrated by several studies. Notably, postoperative fecal incontinence has been reported, especially after the STARR procedure.

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

STARR

- STARR (stapled transanal rectal resection)
- For obstructed defecation
- Special stapling device

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

Table 2 Outcome measures for long-term efficacy and safety (%)

Outcome measure	PPH group (n = 54)	Control group (n = 54)	χ^2 value	P value
Anal stenosis	1 (1.8%)	3 (5.6%)	0.26	0.610
Anal tenesmus	15 (27.8%)	13 (24.0%)	0.193	0.661
Sensory anal incontinence	2 (3.7%)	7 (12.9%)	3.951	0.041
Recurrence	6 (11.1%)	9 (16.7%)	0.697	0.404
Difficulty in defecation	7 (12.9%)	13 (24.0%)	2.209	0.137

PPH: Procedure for prolapse and hemorrhoids.

Table 1 Outcome measures for short-term efficacy and safety

Outcome measure	PPH group (n = 54)	Control group (n = 54)	χ^2 value	P value
Operative time, min	26 (3.1)	18 (2.7)	17.74	<0.001
Postoperative hospital stay, d	2 (3.4)	3 (5.2)	0.04	0.831
Urinary retention, n (%)	26 (48.1%)	20 (36.9%)	1.94	0.163
Perineal edema, n (%)	10 (18.5%)	21 (38.9%)	5.115	0.023
Postoperative VAS score				
At 24 h	29 (6.9)	63 (11)	27.03	<0.001
At one day	23 (8.5)	62 (8)	36.65	<0.001
At one week	17 (6.5)	59 (8.7)	38.205	<0.001

VAS: Visual analog scale; PPH: Procedure for prolapse and hemorrhoids.

Table 3 Outcome measures for long-term efficacy and safety (%)

Outcome measure	PPH group (n = 54)	Control group (n = 54)	χ^2 value	P value
Anal stenosis	1 (1.8%)	3 (5.6%)	0.26	0.610
Anal tenesmus	15 (27.8%)	13 (24.0%)	0.193	0.661
Sensory anal incontinence	2 (3.7%)	7 (12.9%)	3.951	0.041
Recurrence	6 (11.1%)	9 (16.7%)	0.697	0.404
Difficulty in defecation	7 (12.9%)	13 (24.0%)	2.209	0.137

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

“金陵手术”

- 南京军区南京总医院全军普通外科研究所对顽固性混合性便秘的外科治疗进行了技术创新, 即施行结肠次全切除解除慢传输病因, 同时行升结肠直肠(后壁)侧侧吻合, 纠正盆底解剖和功能紊乱, 从而解除了出口梗阻病因。

浙江中医药大学附属医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

我科经验

- 直肠前突为出口梗阻性便秘主要器质性改变之一，在多数出口梗阻性便秘关于肛门直肠测压的报道中，肛门收缩压均下降，肛门最大收缩压下降意味着这类患者肛门外括约肌及耻骨直肠肌的收缩功能降低。Perry RE[1]的研究工作发现距离肛门约1cm为横纹肌复合体的中心位点，且肛管前方形成整个括约肌复合体压力最大值区域。而直肠前突这一病理改变破坏了肛门前侧的正常解剖，因此肛管最大收缩压较正常组明显降低。
- 本研究发​​现盆底肌痉挛患者力排相舒张压降低，与Pucciani[2]等的研究结果相一致，Pucciani认为上述诊断结果有助于判断下一步括约肌功能康复治疗效果。

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

生物反馈结合艾灸治疗排便障碍患者

我科经验

- 对功能性便秘患者随机分为2组，治疗1组（生物反馈组）、治疗2组（艾灸结合生物反馈组）。
- 生物反馈治疗应用生物反馈仪，采用图文、声音的多媒体方式指导患者训练盆底肌群，每天1次，20天为1疗程，一般进行2疗程治疗。
- 治疗2组加用艾灸治疗，采用腹部与背部相应的穴位交替施灸中脘、神厥、关元、天枢、足三里与脾俞、胃俞、肾俞、大肠俞、涌泉等穴，每天1次，20天为1疗程。
- 比较2组患者疗效、满意度，治疗前后排便间隔、粪便性状、排便时间、排便不尽感、肛门直肠阻塞感等的CSS评分变化以及治疗前后心理调查量表指标变化，进行统计学分析。

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

结果

我科经验

n	便秘症状评分 (CSS)		汉密尔顿焦虑量表 (HAMA)		
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	
治疗一组	38	10.63±1.14	5.76±1.68	23.33±3.98	17.25±4.54
治疗二组	39	11.05±1.39	6.35±1.59	21.87±5.01	11.12±3.28
p=0.14>0.05, 无统计学差异			p=0.03<0.05		

生物反馈患者共38例，男性12例，女性26例；艾灸结合生物反馈患者共39例，男性10例，女性29例。平均年龄51.21±7.94。平均治疗2个疗程，二组患者便秘症状及心理症状评估均改善明显，其中，便秘症状组间比较无显著差异。艾灸结合生物反馈组心理症状改善程度优于单纯生物反馈治疗组。p=0.03<0.05

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

Longo ODS 评分 (151例)

我科经验

	手术前	手术后	P
分值	12.31+3.06	3.59+1.98	<0.001

ODS=9 Longo ODS分 (0-40) 正常人<2

Boccasanta P et al. Stapled Transanal Rectal Resection in Solitary Rectal Ulcer Associate with Prolapse of the Rectum: A Prospective Study. Dis Colon Rectum

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

TST

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

患者，男性，65岁，“反复便血5年余，排便不尽感2年”

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE

患者，男性，56岁，因“排便费力1年余，便血1周”入院

术式：TST33——环切

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

TST+ STARR

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

患者，女性，45岁。因“排便困难两年余”入院。查体：腹软，无压痛，指检：距肛缘6cm处及新生物。结肠运输试验提示：结肠慢传输。查排粪造影提示：乙状结肠冗长，内脏下垂，盆底疝？请结合临床。会阴下降。直肠中度前突。查肠镜无明显异常。

手术名称：结肠次全切除术

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

•TST36手术

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

一般情况：

		例数
性别	男	1
	女	14
诊断	混合痔	11
	直肠脱垂	13
	直肠前突	13
	便秘	9
排粪造影	直肠前突	轻度 2
		中度 2
		重度 9
	直肠粘膜脱垂	轻度 1
		中度 4
	重度 10	
	耻骨直肠肌痉挛	1
麻醉方式	腰麻	13
	硬膜外麻	2
手术体位	俯卧折刀位	13
	截石位	2

浙江省人民医院 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

手术用时	20-48 (31.87±8.22) min
术中出血	5-20 (11.87±4.58) ml
吻合口距齿线距离	2.11±0.30cm
切除粘膜体积	11.83±0.65ml
术后住院时间	11.83±0.65d

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

术后并发症

疼痛			出血		水肿	尿潴留
轻	中	重	渗血	波动性出血		
4	7	3	4	2	1	2

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE 肛肠中心 Bring You Health and Happiness

随访

	便血	水肿	坠胀	每日排便次数	疼痛
术后一月	无	1例 (6.67%)	无	1-2次 1.27±0.46	8例 (VAS评分2.13±0.83)
术后三月	2例偶有便血	1例 (6.67%)	无	1-2次 1.13±0.35	2例 (VAS评分均为1分)
术后三月	无	1例 (6.67%)	无	1-2次 1.07±0.26	无

浙江省人民医院
TONGDE HOSPITAL OF ZHEJIANG PROVINCE 肛肠中心 Bring You Health and Happiness